

## LES OISEAUX EN VALAIS, EN 1969

par Jean-Claude Praz, étudiant, Sion

Cette année a été caractérisée par un hiver sans neige en plaine, ce qui a favorisé le recensement des rapaces, surtout les Buses et les Crécerelles. Un temps instable à la fin avril a arrêté chez nous un certain nombre de migrateurs qui se sont parfois attardés plus que d'habitude. L'été pluvieux et froid a eu une influence désastreuse sur la nidification sur le Plateau suisse, mais ne semble pas avoir affecté le Valais. Les observations sont suivies des initiales de l'observateur: CB = Carlo Bottani, MD = Michel Desfayes, BM = Bernard Michellod, JCP = Jean-Claude Praz, PAO = Pierre-Alain Oggier.

Deux Grèbes huppés **Prodicops cristatus** se sont arrêtés le 2 avril à la gravière de Granges (BM). Des Grèbes castagneux **Podiceps ruficollis** ont été contraints à faire halte chez nous et nous avons observé des concentrations inhabituelles pour la région: 6 ind. le 24 avril à Granges (BM), 13 le 26 à Agarn; la plupart n'était plus là le lendemain.

A part quelques Aigrettes garzettes **Egretta garzetta** et Héron bihoreau **Nycticorax nycticorax** habituels, nous avons observé un Héron crabier **Ardeola ralloides** le 5 mai à Grône. Dans cette réserve également se tient un jeune Héron bihoreau le 9 août.

Le Cygne tuberculé **Cygnus olor** est devenu un hôte habituel de la gravière de Granges: un individu a hiverné grâce à la nourriture régulièrement apportée par les habitants de la région. A la mi-avril, il disparaît quelques jours et un ind. (le même ?) revient avec deux jeunes encore grisâtres. Ils y restent jusqu'en juin, sont irréguliers ensuite. Plusieurs observations de Cygnes en vol à Riddes indiquent qu'ils viennent du Léman.

Les Buses **Buteo buteo** étaient assez peu nombreuses au début de l'hiver; une arrivée assez importante se produit dans la deuxième moitié de janvier: 16-17 entre Viège et Riddes le 25 (CB) et sont presque toutes de la variété claire. Cinq à six Autours **Accipiter gentilis** ont hiverné dans le Valais central; un couple se tient le 29 décembre 1968 à Champlan près d'une importante concentration de Grives litornes, de Pinsons et de Verdiers. La femelle semble apprécier les grandes proies: elle plume un Faucon crécerelle près du cadavre en partie mangé d'un Epervier

femelle **Accipiter nisus** (JCP). Le Milan royal **Milvus milvus** est un hôte d'hiver nouveau pour la région. Un individu est observé plusieurs fois à partir du 15 décembre mais ce n'est que le 3 janvier que nous pouvons l'identifier avec certitude : il chasse sur les vignes, entre Chamoson et Ardon où des centaines de Litornes **Turdus pilaris** se nourrissent. Un couple de Milans noirs **Milvus migrans** construit une aire le 9 avril près de Martigny; celle-ci n'a pas été occupée par la suite (PAO). Un Balbuzard pêcheur **Pandion haliaetus** est noté le 27 mars à Grône (BM). Malgré de longues recherches, l'aire du Faucon pèlerin **Falco peregrinus** n'a pu être trouvée. Il semble qu'un seul individu était présent dans la région (CB). Un individu est observé en mai à Finges (CB). Un Faucon kobez **Falco vespertinus** chasse le 5 mai sur l'aérodrome de Sion (JCP); quatre individus se sont attardés dans le Haut-Valais : ils sont présents les 1 et 5 juin à Agarn où ils semblent ne se nourrir que d'insectes (CB). 12-13 Crécerelles **Falco tinnunculus** ont hiverné dans la plaine du Rhône. Huit d'entre elles sont capturées et baguées. Deux mâles adultes seulement étaient présents et l'un est nicheur local : bagué le 15 avril 1968 à Aproz, il a été contrôlé à Chamoson le 14 décembre de la même année (CB).

Une Marouette ponctuée **Porzana porzana** morte a été trouvée le 19 mai dans les vergers près de la ville de Sion ; bien qu'il n'y ait pas de lignes électriques dans les environs immédiats, c'est probablement de cette façon qu'elle s'est tuée (BM). L'espèce a chanté à nouveau à Grône cet été (BM). Un Pluvier argenté **Pluvialis squatarola** s'est arrêté le 27 avril à Grône, pour la première fois en Valais central. Le Petit Gravelot **Charadrius dubius** a été observé sans interruption depuis le 7 avril jusqu'en septembre près de la gravière de Granges ; la nidification est probable mais non prouvée. La Bécasse **Scolopax rusticola** a niché à Finges : près d'un chemin très fréquenté, un nid contient 4 œufs froids le 26 mai (CB). Un Chevalier gambette **Tringa totanus** est vu le 7 avril à Agarn ; un individu de cette espèce, bagué à Grône le 16 septembre 1967 s'est fait tué près de Valence (Espagne) à mi-janvier 1969 (CB). Un Chevalier arlequin **Tringa erythropus** séjourne du 4 au 6 septembre dans la réserve. Un Combattant **Philomachus pugnax** y est vu le 24 avril et le 1er mai (BM). Une Guifette observée à Grône le 11 septembre est probablement une Guifette leucoptère **Chlidonias leucoptenus** (CB). Accompagnant un vol de Guifettes noires **Chlidonias niger**, une Guifette moustac **Chlidonias hybrida** s'est arrêtée aux Iles de Sion le 4 mai (JCP).

Une Tourterelle des bois **Streptopelia turtur** est vue les 1 et 8 juin à Agarn, ce qui laisse présumer la nidification de cette espèce en amont

de Finges. Une Chouette effraie **Tyto alba** a été trouvée morte à fin mars à Veysonnaz (1200 m.). Cette espèce est sporadique dans la plaine du Valais central.

Sept Martin-pêcheurs **Alcedo athis** ont été capturés les 5 et 6 septembre à Grône (JCP). Un Rollier **Caraciacs garrulus** est observé le 21 mai à Chemin sur Martigny, à l'altitude de 1000 m. (MD). Une Huppe **Upupa epops** chante le 1er juin à 1200 m. au-dessus de Eggerberg. Des Torcols **Jynx torquilla** chantent le même jour, dans la même région jusqu'à Finnen (1600 m.) et à fin juin, deux chanteurs sont entendus à 2140 m., à Chandolin sur Sierre (PAO).

Des Alouettes lulus **Lullula arborea** nicheuses sont notées à Ardon et Riddes où elles étaient absentes ces dernières années (JCP). Des Hirondelles de rivage **Riparia riparia** sont encore observées le 7 juin à Grône, le 8 à Agarn et aux Iles de Sion. Un Merle de roche **Monticola saxatilis** parade en mai à Valère et un couple est observé le 1er juin à Finges, sur la colline dénudée par l'incendie. Une Gorgebleue à miroir roux **Luscinia s. suecica** est identifiée le 20 avril à Grône (BM). Les Litornes **Turdus pilaris** sont de plus en plus fréquentes en Valais en été : 2 individus le 8 juin à Agarn, 1 le 6 juillet à Villa-Hérens et dès le 18 juillet à Chamason (PAO). Un Merle noir **Turdus merula** chante à 2000 mètres le 26 juin dans la vallée de Binn.

Une Locustelle tachetée **Locustella naevia** chante pendant quelques jours dans les champs de blé, près de Liddes (1300 m.) ce printemps (JCP). Comme en 1967, un Hypolais icterine **Hippolais icterina** a chanté sur les berges du Rhône, à Bramois, dès le 21 mai (JCP). La Fauvette orphée **Sylvia hortensis** a chanté en plusieurs endroits du Haut-Valais ; malgré plusieurs journées d'observations dans la région d'Agarn, elle n'y a été entendue qu'une fois (CB). Comme les Pie-grièches écorcheur **Lanius collurio** ont également fortement diminué dans le même biotope, on peut se demander si le traitement contre les hannetons du printemps 1968 n'est pas responsable de cette diminution d'oiseaux insectivores. Une Fauvette à tête noire **Sylvia atricapilla** baguée à Sion le 1er septembre 1968 a été tuée à Alger le 10 février 1969 (CB). Une fauvette babillarde **Sylvia curruca**, migratrice, baguée en septembre 1968 aux Iles de Sion y a été contrôlée cette année (CB). Un pouillot fitis **Phylloscopus trochilus** chante en juin à la tourbière de Vionnaz, dans un biotope où il paraît nicher (MD). Cinq Rémiz **Remiz pendulinus** passent le 20 avril à Grône (BM).

Le Bruant proyer **Emberiza calandra** a niché cette année au même endroit que l'année passée à Agarn; il nourrissait des jeunes le 3 août (CB). Un Bruant des roseaux **Emberiza schoeniclus** bagué le 5 octobre 1968 à Grône a été contrôlé le 15 avril à Zoug (CB). Un Pinson des arbres **Fringilla coelebs** bagué le 22 février 1968 en hivernage à Uvrier a été tué le 10 octobre de la même année à Vérone (Italie), montrant ainsi un changement de quartier d'hiver (JCP). De nombreux Tarins **Carduelis spinus** chantent le 26 juin au-dessus de Feld (1800 m), dans la vallée de Binn. Pour la deuxième année consécutive, un petit groupe de Sizerins **Carduelis flammea** estive à Sion. Au sud de la ville, un couple au moins manifeste une activité nidificatrice régulière et est observé de mai en juillet sans interruption. De petits groupes de 3-4 individus sont également observés ailleurs en ville, peut-être les mêmes en vagabondage. Il est curieux que cet oiseau, nichant habituellement à la limite des arbres, vers 1800-2200 mètres d'altitude, essaie de s'installer en plaine dans des jardins (JCP). M. Desfayes en observe également le 5 juin à Finges et 1 individu est vu le 28 juin à Ardon (JCP), dans un verger de pommiers. Un Gros-Bec **Coccothraustes coccothraustes** est vu en mai sur le coteau de Vouvry (MD) et à Briex au-dessus de Chippis (CB).

Deux Craves **Pyrhcorax pyrrhcorax** sont observés le 4 octobre avec des Chocards dans les Mayens de Conthey (JCP), les apparitions de cette espèce sur la rive droite du Rhône sont exceptionnelles.