

LES LEPIDOPTERES DIURNES DE RAVOIRE

par Léonard P. Closuit

Ravoire désigne l'ensemble du coteau situé à l'ouest de Martigny, délimité par le Mont de l'Arpille (2088 m.), la pointe de Soulze (1838 m.), les rochers d'Ottan (1696 m.) et descendant jusqu'à la Fontaine (814 m.), Plan Cerisier (567 m.) et le Château de la Bâtiaz (520 m.).

Ce vaste territoire de la commune de Martigny-Combe est formé d'un vignoble, à la base, de prés en terrasses entourés de vastes forêts et de rochers abrupts au nord (Gottreux 1720 m.).

La région de Ravoire, très fortement exposée aux rayons du soleil, est avec celle des Follaterres l'endroit le plus intéressant de la région de Martigny pour sa flore et sa faune, plus particulièrement les lépidoptères diurnes. Les entomologistes ont, jusqu'à ce jour, mal exploré cette région se bornant à parcourir la partie inférieure. En effet, la faune entomologique abondante de Ravoire n'a été étudiée conjointement que par les naturalistes Emile Favre et Arnold Wulschlegel, à la fin du siècle passé (lire: «Faune des macro-lépidoptères du Valais», Schaffhouse 1899) et, plus près de nous, par Philippe Farquet (lire: «Le Mont Ravoire sur Martigny», bulletin de la Murithienne, fascicule LVII, année 1939-1940). La région voisine des Follaterres a, par contre, été explorée d'une façon exemplaire par les entomologistes allemands, Dr Walter Forster, conservateur de la section d'entomologie du Musée de zoologie de Munich, et Dr Theodor Wohlfahrt, professeur de zoologie à l'Université de Würzburg (lire: «Die Schmetterlinge Mitteleuropas — Tagfalter Diurna — Rhopalocera und Hesperiidæ», Stuttgart 1955).

Si les entomologistes contemporains connaissaient l'abondance des espèces que l'on peut capturer sur les prairies du coteau de Ravoire, cet endroit leur procurerait de grandes satisfactions car, en parcourant divers lieux ayant pour noms: Sommet des Vignes (780 m.), en Gillioud (600 m.), Lesarmand (1050 m.), le Closuit (1070 m.), Laboureau (1091 m.), le Feylet (1187 m.), Sur le Mont (1144 m.), Planojean (1000 m.), Le Crettex (1048 m.), Cheseaux (1080 m.), La Forêt (1284 m.), Les Rapperens (1208 m.), La Barme (1400 m.), les pâturages de l'Arpille (1781 m.), Chez les Pillet (1323 m.), Croix de Chioeu (1695 m.), ils

pourraient constituer sans difficulté, d'avril à octobre, une intéressante collection réunissant les principaux lépidoptères diurnes de l'Europe Centrale, caractéristiques du climat de cette région ensoleillée, abritée, jouissant d'une grande tranquillité.

Voici une nomenclature des lépidoptères diurnes peuplant la région de Ravoire avec indication des dates et endroits de capture.

1. *Papilio machaon*, ssp. *gorganus*, gen. *vernalis*, ♂ Sur le Mont, 25.6.70, ♀ Sur le Mont, 12.6.70.
2. *Papilio machaon*, ssp. *gorganus*, gen. *aestivalis*, ♂ Le Closuit, 3.8.70, ♀ Planojean, 18.7.70.
3. *Papilio machaon*, var. *alpica*, ssp. *Sphyrus*, ♂ Sur le Mont, 2.8.68, ♀ Lesarmand, 24.7.70 — Croix de Chioeu, 12.8.70.
4. *Iphiclides podalirius*, gen. *vernalis*, ♂ En Gillioud, 24.5.70, ♀ Cheseaux-Demé, 2.7.70.
5. *Iphiclides podalirius*, var. *zanclaeides*, gen. *aestivalis*, ♂ Cheseaux, 21.7.70, ♀ Cheseaux, 18.7.70.
6. *Iphiclides podalirius*, var. *inalpina*, ♂ Les Rapperens, 7.8.70, ♀ La Barme, 12.8.69.
7. *Iphiclides podalirius* var. *feisthamelli*, ♀ Cheseaux-Demé, 20.6.70.
8. *Parnassius apollo* ssp. *bartholomeus*, ♂ Sur le Mont, 6.7.70, ♀ Sur le Mont, 18.7.70.
9. *Parnassius apollo* ssp. *brittingeri*, ♂ Sur le Mont, 25.6.70.
10. *Parnassius apollo* ssp. *geminus*, ♂ Le Closuit, 7.7.70, ♀ En Gillioud, 11.7.70.
11. *Parnassius apollo* ssp. *rubidus*, ♂ Le Closuit, 12.7.70.
12. *Parnassius apollo* ssp. *melliculus*, ♂ Les Rapperens, 21.7.70.
13. *Parnassius mnemosyne*, ♂ ♀ Sur le Mont, 6.7.70.
14. *Aporia crataegi*, ♂ Sur le Mont, 6.7.70, ♀ Le Closuit, 10.7.70.
15. *Pieris brassicae*, ♂ En Gillioud, 24.6.70, ♀ Château de la Bâtiaz, ♀ Château de la Bâtiaz, 25.5.70.
16. *Pieris rapae*, ♂ Château de la Bâtiaz, 14.7.70, ♀ Cheseaux-Demé, 10.8.70.
17. *Pieris manni*, ♂ Sommet des Vignes, 27.7.70, ♀ Cheseaux, 11.7.70.
18. *Pieris napi*, ♂ Château de la Bâtiaz, 25.5.70, ♀ Le Crettex, 22.8.70.
19. *Pieris bryoniae*, ♀ La Barme, 11.6.70.
- 19 a. ssp. *flavescens*, gen. *aestivalis*, ♂ ♀ Pâturages de l'Arpille, 10.8.70.
20. *Euchloë simplonia* respectivement *ausonia*, ♂ ♀ Pâturages de l'Arpille, 8.6.70.

21. *Anthocaris cardamines*, ♂ ♀ Château de la Bâtiaz, 11.5.70.
22. *Gonepteryx rhamni*, ♂ Cheseaux-Demé, 6.7.70, ♀ Le Crettex, 3.8.70.
23. *Colias phicomone*, ♂ Pâturages de l'Arpille, 9.7.70.
24. *Colias australis*, ♂ Le Closuit, 12.7.70, ♀ Cheseaux-Demé, 2.8.70.
25. *Colias croceus*, gen. *vernalis*, ♀ Lesarmand, 27.7.70.
- 25 a. var. *helice*, ♀ Cheseaux, 10.8.70.
26. *Colias hyale*, ♂ Cheseaux-Demé, 28.6.70, ♀ Le Closuit, 7.7.70.
27. *Leptidea sinapis*, ♂ ♀ Château de la Bâtiaz, 25.5.70.
28. *Erebia ligea*, ♂ ♀ Cheseaux-Demé, 12.7.70.
29. *Erebia alberganus*, ssp. *ceto*, ♂ ♀ Cheseaux, 17.7.70.
30. *Erebia tyndarus*, ♂ Pâturages de l'Arpille, 7.8.70.
31. *Agapetes galathea*, ♂ Sur le Mont, 12.7.70, ♀ Planojean, 6.7.70.
32. *Hipparchia fagi*, ♂ Cheseaux-Demé, 12.7.70, ♀ Planojean, 6.7.70.
33. *Hipparchia aelia*, ♂ Le Crettex, 12.7.70, ♀ Cheseaux, 17.7.70.
34. *Hipparchia semele*, ♀ Planojean, 7.8.70.
35. *Hipparchia statilinus*, ♀ Cheseaux, 7.8.70.
36. *Minois dryas*, ♀ En Gillioud, 24.8.69.
37. *Satyrus ferula*, ♂ Sur le Mont, 10.7.70, ♀ Planojean, 12.7.70.
38. *Dira megera*, ♂ Cheseaux, 21.7.70, ♀ Chez Les Pillet, 4.8.70.
39. *Dira maera*, ♂ Planojean, 22.7.70.
- 39 a f. *adrasta*, ♀ Planojean, 4.8.70.
40. *Hyponephele lycaon*, ♂ ♀ Cheseaux, 12.7.70.
41. *Maniola jurtina*, ♂ Laboureau, 7.7.70, ♀ En Gillioud, 7.7.70.
42. *Coenonympha pamphilus*, ♂ Cheseaux, 12.7.70.
43. *Vanessa atalanta*, ♂ ♀ Eglise de Ravoire, 27.9.70.
44. *Vanessa cardui*, ♀ Planojean, 28.7.70.
45. *Aglais urticae*, ♂ Cheseaux-Demé, 6.7.70, ♀ Laboureau, 23.6.70.
46. *Inachis io*, ♂ ♀ Eglise de Ravoire, 18.9.70.
47. *Nymphalis polychloros*, ♂ Cheseaux, 18.8.70, ♀ Le Closuit, 26.8.67.
48. *Nymphalis antiopa*, ♂ Le Feylet, 27.7.70, ♀ Eglise de Ravoire, 6.8.67.
49. *Polygonia c-album*, ♂ Eglise de Ravoire, 14.9.69,
♀ Eglise de Ravoire, 16.9.69.
50. *Melitaea athalia*, ♂ Planojean, 5.7.70.
51. *Melitaea cinxia*, ♂ Laboureau, 6.7.70, ♀ Sur le Mont, 22.6.70.
52. *Melitaea parthenie*, ♂ Sur le Mont, 12.7.70, ♀ Cheseaux, 6.7.70.
53. *Melitaea didyma*, ♂ Sur le Mont, 12.7.70, ♀ Le Crettex, 18.7.70.
54. *Mesoacidalia charlotta*, ♂ Sur le Mont, 24.7.70,
♀ Les Rapperens, 21.7.70.
55. *Fabriciana niobe*, ♂ ♀ Sur le Mont, 12.7.70.
56. *Fabriciana adippe*, ♂ ♀ Sur le Mont, 10.7.70.

57. *Argynnis paphia*, ♂ ♀ Château de la Bâtiaz, 27.7.70.
58. *Brenthis ino*, ♂ ♀ Sur le Mont, 12.7.70.
59. *Clossiana selene*, ♀ Sur le Mont, 12.7.70.
60. *Clossiana titania*, ♂ ♀ Sur le Mont, 10.7.70.
61. *Clossiana dia*, ♂ Sur le Mont, 22.8.70.
62. *Issoria lathonia*, ♂ ♀ Sur le Mont, 14.8.70.
63. *Callophrys rubi*, ♂ L'Arpille, 10.6.70, ♀ Croix de Chioeu, 25.6.70.
64. *Heodes alciphron*, ♀ Le Crettex, 10.7.70.
65. *Heodes tityrus*, ♀ Le Crettex, 10.7.70.
66. *Heodes virgaureae*, ♂ Cheseaux, 5.7.70, ♀ Sur le Mont, 12.7.70.
67. *Palaeochrysophanus eurybia*, respectivement *hippotoe*,
♂ La Barme 18.7.70.
68. *Cupido sebrus*, ♂ ♀ Laboureau, 27.7.70.
69. *Celastrina argiolus*, ♀ Le Crettex, 10.7.70.
70. *Glaucopsyche alexis*, ♂ Cheseaux, 6.7.70.
71. *Lycaeides idas*, ssp. *valesiaca*, ♂ La Forêt, 12.8.70.
72. *Lycaeides argyrognomon*, ♂ La Barme, 12.8.70.
73. *Aricia allous*, ♂ Planojean, 28.6.70.
74. *Cyaniris semiargus*, ♂ ♀ Cheseaux-Demé, 28.6.70.
75. *Polyommatus icarus*, ♂ Cheseaux-Demé, 8.7.70.
76. *Lysandra bellargus*, ♂ Sommet des Vignes, 22.6.70,
♀ Le Crettex, 18.7.70.
77. *Lysandra coridon*, ♂ Cheseaux-Demé, 18.7.70.
- 77 a ssp. *borussia*, ♂ Cheseaux, 19.7.70.
78. *Meleageria daphnis*, ♂ Cheseaux-Demé, 18.7.70.
79. *Pyrgus carthami*, ssp. *valesiaca*, ♂ Cheseaux, 6.7.70,
♀ Sur le Mont, 25.6.70.
80. *Pyrgus alveus*, ♂ Sur le Mont, 22.6.70.
81. *Adopaea lineola*, ♀ Chez Les Pillet, 12.7.70.
82. *Adopaea silvester*, ♂ ♀ Sur le Mont, 12.7.70.
83. *Thymelicus actaeon*, ♂ Sur le Mont, 4.8.70.
84. *Ochlodes venata*, ♂ Sur le Mont, 6.7.70.
85. *Hesperia comma*, var. *alpina*, ♂ Sur le Mont, 27.7.70,
♀ Sur le Mont, 4.8.70.
86. *Reverdinus marrubii*, ssp. *octodurensis*, ♂ Le Fays, 7.9.70.

Nota bene

Favre et Farquet citent «*Satyrus briseis*» (respectivement *Chazara briseis*) sur le coteau de Ravoire et Wullschlegel «*Hesperia* var. *cirsii*» (respectivement *Pyrgus cirsii*) entre La Bâtiaz et le Closuit. Nous sommes

certaines que ces deux lépidoptères, s'ils existèrent autrefois dans cette région (?), ont complètement disparu de nos jours. Certains autres, abondants dans le passé: *Papilio machaon* var. *alpica* ssp. *sphyrus*; *Iphiclides podalirius* var. *feisthamelli*; *Parnassius apollo* ssp. *bartholomeus*, ssp. *brittingeri*, ssp. *rubidus*, ssp. *geminus*; *Parnassius mnemosyne*; *Nymphalis polychloros*; *Nymphalis antiopa*, *Argynnis paphia* et sa var. *valesina* sont vus de moins en moins et deviennent des espèces, sous-espèces et variétés rares, recherchées par les entomologistes du monde entier. L. C.

Ravoire, septembre 1970.