

Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2002 à l'été 2004

Rapport de l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse

par Emmanuel Revaz¹

Bull. Murithienne 122 : 55-76

EINLEITUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis: von Herbst 2002 bis Sommer 2004

Über 16 000 Meldungen von rund 230 Beobachterinnen und Beobachtern dienten als Basis für die hier vorliegende Zusammenstellung, die ausnahmsweise zwei Jahre mit ihren Zugzeiten und Brutsaisons abdeckt. Während dieser Zeit hat die Aussenstelle Salgesch der Schweizerischen Vogelwarte ihre Bemühungen zum Schutz gefährdeter Arten fortgesetzt. So war dem nun gemeinsam mit der Universität Bern durchgeführten **WIEDEHOPF**-Projekt vorerst ein Aufsehen erregender Erfolg beschieden. Ein anderes Beispiel für die Zusammenarbeit ist die Besenderung von Walliser **UHUS**; dieses Uni-Projekt wurde durch Felderhebungen von verschiedenen Walliser Ornithologen aktiv unterstützt. Die Überwachung der Bestände von **TURMFALKE** und **SCHLEIEREULE** begann zur Routine zu werden. Ersterer zeigt im Talgrund dank der Montage vieler Nisthilfen einen beginnenden Bestandsanstieg. In Zusammenarbeit mit Kantonsförstern konnten zusätzliche Waldlichtungen geschlagen werden, die der **NACHTSCHWALBE** helfen sollen. Zudem wurden konkrete Massnahmen getestet, um die letzten **ZWERGOGREULEN** im Mittelwallis zu unterstützen: Indem sie das Aufkommen von Grasstreifen, die nicht gemäht werden, subventionierte, erhoffte sich die Vogelwarte den Aufbau eines attraktiven Nahrungsreservoirs für die wenigen verbleibenden Paare. Gefördert werden sollten insbesondere Heuschrecken. Im untersten Talabschnitt hat sich die Aussenstelle für die Errichtung von Hecken und Windschutzstreifen engagiert, um die grossflächige Kulturlandschaft für die Brutvögel aufzuwerten. Zum Programm gehörte auch die Überwachungstätigkeit bei Prioritätsarten: Fortsetzung der Bestandserhebung des **STEINRÖTELS** im Gebirge, Kartierung der **BRAUNKEHLCHEN**-Bestände im Goms und kantonweite Erfassung der **ORTOLAN**-Reviere, mit dem Ziel, eine Situationsanalyse der letzten Schweizer Population vorzunehmen.

Parallel zu diesen spezifischen Projekten bleibt die generelle Überwachung der Avifauna eine ergänzende, unverzichtbare Aufgabe. Wir sprechen deshalb den engagierten, unermüdlichen, altbewährten und neuen Beobachterinnen und Beobachtern unseren herzlichsten Dank aus. Sie beteiligen sich an vorderster Front an dieser Überwachung und ermöglichen uns damit, die Zukunftsaussichten präziser herauszuschälen und die Bedrohungen

und Risiken für die Vögel des Wallis und ihrer Habitate zu erkennen. Wir danken auch jenen Leuten, die einen aktiven Beitrag an diese neue ornithologische Chronik geleistet haben: Jean-Claude und Anita Praz von der *Murithienne* für die Fristerstreckung; Bernard Volet und Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte für den speditiven Datenaustausch und die Übersetzung ins Deutsche; Jérôme Fournier und Emile Sermet für ihre künstlerischen Pinselstriche; Bertrand Posse für seine fortwährende Mitarbeit und die Durchsicht des Manuskriptes.

INTRODUCTION

Plus de 16 000 données envoyées par quelque deux cent trente observatrices et observateurs ont servi de base à la rédaction de la présente synthèse, qui couvre, une fois n'est pas coutume, deux années de migration et de reproduction. Durant ce laps de temps, l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse a poursuivi ses efforts dans le domaine de la protection des espèces menacées. Ainsi, le projet de conservation de la **HUPPE FASCIÉE**, désormais mené de concert avec les biologistes de l'Université de Berne, débouche sur un succès provisoire retentissant. Autre exemple de collaboration, le suivi par télémétrie des **GRANDS-DUCS** valaisans, projet de recherche universitaire renforcé par la prospection active menée sur le terrain par plusieurs ornithologues valaisans. Le contrôle des populations de **FAUCON CRÉCERELLE** et d'**EFFRAIE** rentre quant à lui dans son rythme de croisière, mettant en évidence une tendance naissante à l'augmentation des Crécerelles de plaine grâce à l'installation de nombreux nichoirs. En collaboration avec les forestiers du canton, des clairières supplémentaires ont été créées en faveur de l'**ENGOULEVENT**. Des mesures concrètes ont également été testées dans le but de favoriser les derniers **PETITS-DUCS** du Valais central: en subventionnant la mise en place de bandes herbeuses non fauchées, la Station ornithologique espère permettre la constitution de réservoirs de proies (principalement des orthoptères) suffisamment attractifs pour les quelques couples relictuels. Dans la basse plaine, l'Antenne valaisanne s'active pour la restauration de structures (haies, rideaux-abris) susceptibles de rendre les grandes terres cultivées moins hostiles à l'avifaune nicheuse. Pour terminer ce bref survol de nos activités, citons encore nos programmes de

surveillance ciblés sur des espèces prioritaires : poursuite du suivi du **MONTICOLE DE ROCHE** en montagne, cartographie du **TARIER DES PRÉS** dans la haute vallée de Conches, et prospection intensive du **BRUANT ORTOLAN** menée dans tout le canton, dans le but de dresser un état de santé de la dernière population suisse de l'espèce.

Parallèlement à ces projets spécifiques, le suivi général de l'avifaune demeure un aspect complémentaire et indispensable. Nous exprimons donc notre chaleureuse gratitude aux observateurs inlassables et passionnés, anciens et nouveaux, qui participent activement à cette surveillance, nous permettant ainsi de mieux cerner les perspectives d'avenir, les menaces et les enjeux liés aux oiseaux du Valais et à leurs habitats. Nous remercions également les différentes personnes qui ont apporté leur contribution directe à cette nouvelle chronique ornithologique : Jean-Claude et Anita Praz de *La Murithienne* pour les largesses accordées dans les délais; Bernard Volet et Hans Schmid, de la Station ornithologique de Sempach, pour l'échange efficace d'informations et pour les traductions allemandes; Jérôme Fournier et Emile Sermet pour leur délicate touche artistique; Bertrand Posse pour sa collaboration constante et la relecture du manuscrit.

¹ Centre Nature, 3970 Salquenen

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A aAe=A. Aebischer; rA=R. Arlettaz	M liM=L. Maumary; sMe=S. Mettaz;
B aBa=A. Barbalat; aB=A. Bassin; eBe=E. Bernardi; hBe=H. Berrut; mBn=Max Baumann; cB=C. Bottani	bM =B. Michellod; cMo=Chr. Monnerat; eMo=E. Morard; pMo=P. Mosimann
C gCa=G. Carron; yCr=Y. Crettenand	O pOg=P. Oggier; paO=P.-A. Oggier
D hDu=H. Duperrex; jmD=J.-M. Duflon	P mPe=M. Perraudin; paP=P.-A. Pochon; beP=B. Posse; jC=J.-C. Praz
E mEg=M. Eggenschwiler; sEh=S. Ehrenbold; kEi=K. Eigenheer	R Rz=J.-P. Reitz; eRe=E. Revaz; Rey=J. Rey
F jeF=J. Fournier;	S Sal=P. Salzgeber; jSa=J. Savioz; Sch=M. Schaub; eS=E. Sermet; aSi=A. Sierro; cS=Cl. Sinz
G jmGa=J.-M. Gaillard; aGa=A. Gattlen; aGe=A. Gerber; mGe=M. Gerber; Gey=C. Geyer	T mTh=M. Thélin; jC=J.-Cl. Tièche; oTu=O. Turin
H jHa=J. Hartmann	V Val=L. Vallotton; rV=R. Voisin; bV=B. Volet
J nJ=N. Jordan; moJ=M. Julien	W eWe=E. Weiss; gWy=G. Wyrer
K Ker=P. Kernen; dKl=D. Kleiner; pKn=P. Knaus	Z Zur=S. Zurbriggen
L rLu=R. Lugon	

Puis: **CAvS**=Commission de l'avifaune suisse-**SOS VS**=Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse-**Uni BE**=Biologie de la Conservation de l'Université de Berne-**div. obs.**=divers observateurs

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE

ad=adulte; **ch**=chanteur; **c**=couple; **fam**=famille; **f**=femelle; **imm**=immature; **ind**=individu; **juv**=juvénile; **m**=mâle; **max**=maximum; **min**=minimum; **ssp**=sous-espèce.

AUTOMNE 2002 ET HIVER 2002-2003

En première ligne ornithologique (et médiatique !) de la saison, nous trouvons Romane le jeune **VAUTOUR MOINE**, qui visita les Alpes valaisannes et haut-savoyardes durant quelques semaines avant de rejoindre ses Causses natales. Cette particularité mise à part, certains grands mouvements rapportés à l'échelle nationale se firent également sentir en Valais: vol tardif de **GRUES CENDRÉES**, très forte présence hivernale de **BUSARDS ST-MARTIN**, ou encore des répercussions alpines de l'invasion automnale de **LABBES**. Dans les filets du col de Bretolet, certaines espèces se démarquèrent par leur fréquence inhabituelle: ainsi les **MÉSANGES BLEUES** et **CHARBONNIÈRES**, les **CASSENOIX** et les **BECS-CROISÉS**, dont les bilans de capture attestent de déplacements notoires. Enfin, les perspectives ne sont guère réjouissantes pour les jeunes **GRAND-DUCS** qui naissent dans le contexte urbanisé de la plaine du Rhône: peu d'entre eux semblent dépasser le cap de quelques mois de vie.

HERBST 2002 UND WINTER 2002/2003

Sowohl für die Ornithologen wie auch für die Medien war der Besuch der Walliser und Hochsavoyer Alpen durch Romane, dem jungen **MÖNCHSGEIER** aus den südfranzösischen Causses, das Hauptereignis. Daneben machten sich verschiedene in der übrigen Schweiz festgestellte starke Zugbewegungen auch im Wallis bemerkbar: Ein später Durchzug von **KRANICHEN**, ein starker Winterbestand von **KORNWEIHEN** und alpine Ausläufer bei der herbstlichen **RAUBMÖWEN**-Invasion. In den Fangnetzen auf dem Col de Bretolet fielen verschiedene Arten durch ihre ungewöhnliche Zahlen auf: So machten **BLAU-** und **KOHLMEISEN**, **TANNENHÄHER** und **FICHTENKREUZSCHNÄBEL** mit ihren Frequenzen grossräumige Verschiebungen offenkundig. Daneben zeigte es sich, dass die Aussichten für die im Haupttal geborenen und den Gefahren der Zivilisation ausgesetzten **UHUS** alles andere als rosig sind, überleben doch nur wenige ihre ersten Lebensmonate.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERTGAUCHER

1 à 5 hivernants signalés de façon discontinue entre le 3.11 et le 11.2 à Grône (Rey, Sal), et 1 ind le 7.1 à Martigny (beP).

GRÈBE JOUGRIS, ROTHALSTAUCHER

Une mention peu banale le 18.8 à Lens, 1330 m (aSi).

GRÈBE ESCLAVON, OHRENTAUCHER

Un le 15.12 au Bouveret (R. Jordan).

CORMORAN, KORMORAN

Vu à Grône dès le 28.6 (hDu), à Sion en juillet (mPe). Plus tard dans la saison, 46 ind passent le col de Bretolet le 29.9 (B. Claude), jour où rV dénombre 105 migrants sur Monthey; en ce dernier point, on relève des max de 345



La MÉSANGE CHARBONNIÈRE est une espèce à invasions:
certaines années, elle entreprend de véritables mouvements migratoires, perceptibles sur les cols alpins.
AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER

ind le 24.10 et de 314 ind le 28.10 (rV). Nous retenons également un ind le 28.9 sur Niedergesteln, 2000 m (paO), puis 9 ind le 17.11 à Baltschieder (Ker) et 12-14 ind les 22 et 30.11 à Granges (Rey), site où les isolés du 19.1 et du 2.2 (Rey) constituent les seules mentions du cœur de l'hiver valaisan.

BUTOR, ROHRDOMMEL

1 ind hâtif ou erratique entendu le 16.8 à Leuk (sEH, Sch; CAvS), et 1 oiseau trouvé mort le 1.12 à Grône, probablement des suites d'une collision avec un câble de ligne électrique (P. Keusch).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Six observations de 1-3 ind en provenance de Leuk, réparties entre le 2.8 et le 6.9 (div. obs.), et 1 ind le 20.8 à Finges (Sch).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Isolées le 2.8 à Leuk (Rey), les 25-26.9 à Vouvry (rV) et le 17.11 à Dorénaz (yCr).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

A relever un groupe compact de 29 migrateurs en escale le soir du 3.9 à Illarsaz (rV). En escale d'altitude, un le 12.9 au bord d'un lac du Binntal, 2000 m (pKn). En hiver, signalé à Vionnaz, Dorénaz, Martigny, Sierre et Grône, où l'on relève un max saisonnier de 11 ind le 18.12 (Rey).

HÉRON POURPRÉ, PURPUREIHER

Un le 6.8 à Illarsaz (hBe).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Total automnal d'au moins 5 oiseaux: une le 16.8 sur le bois de Finges (M. Jäggi), une le 18.8 au Pas de Morgins (F. Jeandet), 2 le 29.9 au col de Bretolet (jCT, B. Claude), une le 20.10 à Monthey (J.-M. Fivat), puis le même jour sur Collonges (nJ).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

2 les 3-4.8 à Vouvry-Illarsaz (eRe, rV).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Bien présent de novembre à février dans les champs d'Illarsaz (rV), avec un effectif max de 48 ind les 17.11 et 8.12 (nJ; eS).

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Le 3.11 à Vouvry (nJ) et le 12.1 à Vionnaz (rV).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

2 ind le 15.9 à Martigny (beP), 1-2 entre le 22.10 et le 22.11 à Grône-Granges (Rey), puis un les 14-15.1 au lac de Géronde (Rey).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

A Grône, 1-2 présents du 15.8 au 13.9, puis quatre mentions ponctuelles jusqu'au 24.12 (hDu, beP, Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Premières le 6.8 à Martigny (beP), le 7.8 à Leuk et le 9.8 à Grône (hDu), puis relevons 6-8 ind les 21 et 28.9 à Vionnaz (nJ). Présence automnale et hivernale presque continue sur les plans d'eau de Grône et Granges, où l'on rapporte des max de 39 ind le 24.12 et de 30 ind le 17.2 (Rey). Trois mentions hivernales disparates en provenance de Martigny (beP) et 4 le 7.2 à Monthey (Rz).

CANARD PILET, SPIESSENTE

Des isolés le 27.8 à Grône et le 22.11 à Granges (Rey).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

5 le 7.8 à Leuk (hDu), puis une le 17.8 à Martigny (beP) et trois mentions à Grône, dont celle d'une troupe de 21 ind le 2.9 (Rey), remarquable par son ampleur.

CANARD SOUCHET, LÖFFELENT

1-2 ind vus du 2 au 18.9 à Grône (hDu, Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENT

1-2 ind prennent leurs quartiers d'été à Grône à partir du 23.7 (hDu), se retrouvent à 4 du 2 au 5.9 (hDu, beP, Rey), et disparaissent après le 24.9 (Rey); suit une mention isolée de 2 ind le 26.10 (jSa).

FULIGULE NYROCA, MOORENTE

Un le 20.8 à Grône (Rey).



Le jeune VAUTOUR MOINE surpris lors de son incursion valaisanne. Nax, le 13 août 2002. – PHOTO I. REY

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Les rassemblements familiaux de Grône atteignent un pic d'une soixantaine d'individus le 5.9 (hDu). Le nombre tombe ensuite à 17 ind le 22.9 (jCT), puis sous la dizaine dès le 15.10 (Rey); le dernier oiseau est signalé le 24.12 (Rey).

BONDRÉE, WESPENBUSSARD

En migration de montagne, 2 le 22.8 sur Liddes, 2350 m (J. Gremaud, beP), 3 le 7.9 sur Trient, 2000 m (eMo), 2 le 15.9 sur Martigny-Combe, 1980 m (E. Bertouille); à Bretolet, le passage culmine entre le 14 et le 16.9 (85 ind le 15.9; jCT).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Un premier migrateur le 18.8 à Zeuzier (beP, N. Rieille). Total automnal de 39 rapaces à Bretolet, dont 27 entre le 14 et le 16.9 (jHa, P. Rapin, jCT) et 12 pour le seul 15.9 (jCT).

GYPAËTE BARBU, BARTGEIER

La région de Derborence est toujours occupée par un c de subadultes (ind de 1998 et 1999), qui recharge une aire d'Aigle royal, et un c est présent sur les hauts de Fully entre la fin juillet et la mi-septembre, avec attitude belliqueuse à l'égard des aigles (div. obs.). En dehors du massif des Dents du Midi et de la rive droite entre les Dents de Morcles et Leukerbad, des imm sont observés le 13.8 sur Zinal (J.-M. Chaubert), le 20.10 aux Cornettes de Bise/Vouvry (S. Gex-Fabry), le 30.1 à Randa (I. Imboden), les 4-23.2 dans le haut val de Bagnes (V. May; X. Mettaz) et le 16.2 au-dessus de Tanay (V. Ançay).

VAUTOUR MOINE, MÖNCHSGEIER

Vagabondage d'une f née en 2000 et lâchée dans le cadre du programme de réintroduction des Grands Causses (Massif Central, France): initialement repéré sur Evolène, 2400 m, du 8 au 12.8 (J. Baudat; rA, eRe), l'oiseau se déplace sur les hauts de Nax les 12-13.8 (rA, Gey, eRe, I. Rey), avant de gagner le secteur Getwing-Gampel les 14-15.8 (pOg, beP et al.) et de redescendre la vallée du Rhône, transitant par les hauts de Fully le 19.8 (beP) puis par Mex le 20.8 (O. Goetschi par rV). Après un passage dans les Alpes haut-savoïardes, il est à nouveau vu sur territoire suisse le 8.9 à Bretolet (Chr. Perret-Gentil, R. Imstef, Sal et al.). Il s'agit là de la cinquième mention suisse pour l'espèce, la première depuis 1938 (BAUDAT et al. 2003).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Observé entre le 3.9 et le 20.10, les deux fois à Vouvry-Collombey (eS, rV), seules mentions de plaine. 9 migrateurs le 7.9 sur Trient, 2000 m (eMo), 1 le 16.9 sur Emosson, 2800 m (V. Martin) et max de 118 le 19.9 à Bretolet (jHa).



BUSARD ST-MARTIN, KORNEWIHE

La présence record enregistrée au niveau suisse se répercute également en Valais : huitante et une mentions étalées entre le 4.9 et le 26.2, dont les deux tiers concentrés dans la basse plaine entre Collombey et Vouvry, où l'espèce est signalée de façon presque continue dès le 11.10, avec un max saisonnier de 6 ind le 22.11 (J.-M. Fivat). En dehors de ce site, vu six fois sur le coteau entre Chamoson et Savièse (div. obs.), sur Aminona 2000 m le 13.10 (aSi), à Agarn-Turtmann le 16.11 et du 30.12 au 5.1 (mBn; eBe, hDu, R. Wenger), à Martigny le 7.2 (beP, A. Scheurer) et à Grône les 23 et 26.2 (cB; Rey).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Migrateurs observés les 8 et 12.9 à Bretolet (jHa) et le 22.9 à Vouvry (liM, Val).

AUTOUR, HABICHT

Notons une f cerclant le 19.8 sur Zermatt, 3400 m (E. Gunzinger).

EPERVIER, SPERBER

A Bretolet, max journaliers de 32 migrateurs le 15.9, de 25 le 29.9 et de 22 le 13.10 (jCT).

BUSE, MÄUSEBUSSARD

Un max automnal de 65 migratrices le 13.10 à Bretolet (jCT).

BALBUZARD, FISCHADLER

Au col de Bretolet uniquement, où l'on relève 12 ind de passage le 13.9 (jHa).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

A Vouvry-Vionnaz, premier le 28.9, puis vu tous les mois excepté décembre, avec une dernière mention le 18.3 (nJ, eS, rV). Ailleurs, 2 migrateurs le 9.10 à Bretolet (jCT) et un le 19.10 à Martigny (beP).

FAUCON HOBÉREAU, BAUMFALKE

Premiers migrateurs notés le 22.8 sur Liddes, 2420 m (jGr, beP) et le 23.8 à Vionnaz (rV), puis relevons un oiseau le 7.9 sur Trient, 2000 m (eMo); de passage à Bretolet jusqu'au 13.10 (jCT).

LAGOPÈDE, ALPENSCHNEEHUHN

Belle troupe de 16 ind le 1.1 sur Evolène, 2200 m (mTh).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Descend à 1150 m le 25.10 à Zeneggen (aGa), à 1210-1300 m le 30.12 et le 19.1 sur Fully (eBe; jCT), à 1100 m le 8.2 sur Conthey (4 ind; aSi).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

A Martigny, mouvements notés entre le 21.8 et le 16.9, puis présence de 1-2 hivernants relevée entre le 24.12 et le 26.2 (beP); signalé à Grône jusqu'au 24.12 (Rey).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

A Grône, au moins 70 ind le 22.9 (jCT). Afflux noté à fin février : 50 ind le 23.2, 100 le 26.2 (bM; Rey).

GRUE, KRANICH

Une vingtaine le 28.12 à Monthey (E. Hüttenmoser), à placer dans le contexte de l'afflux tardif relevé ailleurs en Suisse.

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Dans les premiers mouvements estivaux de retour, retenons 15 ind le 25.6 à Vouvry (rV), 2 le 14.7 à Collombey, 2 le 31.7 à Charrat (aSi), 7 le 2.8 à Martigny (beP) et 1 le 5.8 à Niedergesteln (Rey); en automne, des max de 175 ind le 6.11 à Vouvry (eS) et de 46 le 8.11 à Martigny (beP).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE

Stationne du 24.2 au 1.3 au bord d'un canal de Martigny (beP; bM, nJ), repérée vraisemblablement en fin d'hivernage.

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Premières dès le 18.7 à Vouvry (rV), puis notons 3 ind le 6.8 à Martigny (beP) et des max de 4 ind les 14-18.8 à Vouvry (nJ; rV) et le 27.10 à Vionnaz (nJ). Observations hivernales : une à Sion le 30.1 (bM), une à Martigny le 7.2 (beP) et 2 à Vionnaz le 22.2 (nJ).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

1-3 ind en escale à Vouvry entre le 5 et le 15.8 (rV).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Passage perceptible à mi-août en plusieurs points du canton : un du 7 au 12.8 à Martigny-Fully (beP), 8 le 12.8 à Illarsaz (rV), 2 du 13 au 15.8 à Vouvry (nJ, rV) et 1 le 16.8 à Grône (Rey).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Les premiers mouvements sont déjà notés le 6.6 à Martigny (liM) et les 20-28.6 à Leuk (hDu). Suivent quatre mentions de juillet, dont celles d'un ind le 12.7 à Lens, 1330 m (aSi) et d'un ind le 24.7 à Geschinen, 1350 m (D. Bianchi), et dix-neuf mentions en août, dont un max de 15 ind le 12.8 à Illarsaz (rV). Un ind hiverner dans une gravière de Riddes (yCr) et un autre est vu le 11.2 à Sion (Rey).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

4 le 28.6 à Leuk (hDu), 19 le 18.7 à Vouvry (rV), un du 4 au 12.8 à Martigny (beP), groupe très important de 29 oiseaux le 12.8 à Illarsaz et 11 le lendemain à Vouvry (rV).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Le 4.8, 4 ind à Martigny (J.-M. Pillet, beP) et un à Blatten, 1800 m (J.-F. Burri); signalé ensuite jusqu'au 3.9.

LABBE À LONGUE QUEUE, FALKENRAUBMÖWE

Deux mentions alpines homologuées par la CAVS, font écho à l'invasion rapportée dans le reste du pays : un ind trouvé affaibli le 25.8 dans une lande alpine près du barrage de Cleuson (S. Praz, yCr, beP), relâché le 6.10 aux Grangettes, et un le 7.9 au lac de Moiry (W. Jost).

LABBE INDÉTERMINÉ, UNBEST. RAUBMÖWE

Un le 7.7 à Martigny-Combe, 2030 m (A. Burri).

MOUETTE REUSE, LACHMÖWE

Notons 15 ind le 14.7 sur le Rhône de Vernayaz (jeF), ainsi que des isolées le 18.10 à Montana, 1420 m (aSi), et le 7.1 à Sierre (Rey).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Quatre mentions d'isolés entre le 6.8 et le 27.10 à Vouvry, Vionnaz et Illarsaz (nJ, rV).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Les comptages de rV dans les champs de Vouvry-Monthey donnent les maxima mensuels suivants : 280 ind le 4.8, 296 le 29.9, 345 le 17.10. Encore très importants à fin octobre-début novembre (274 ind le 27.10, 176 le 3.11), les effectifs fondent en décembre (max de 36 ind le 23.12), et passent sous la barre des 10 ind à début janvier.

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Au moins 150 le 3.10 à Collombey (rV). Quelques dizaines d'individus semblent hiverner entre Vouvry et Collombey : 70-90 ind les 1 et 8.12 (beP; eS), puis trois mentions en janvier, dont un max de 42 ind le 11.1 (nJ).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Une seule mention, le 9.8 à Chamoson (hDu).

COUCOU, KUCKUCK

Un migrateur élevé le 17.9 sur Emosson, 2800 m (eRe).

GRAND-DUC, UHU

Des 12 jeunes Grands-ducs munis d'un émetteur, tous ont atteint l'âge de l'envol. Sur les 10 suivis par télémétrie, 7 périssent déjà dans les cinq premiers mois (aAe, rA et al. Uni BE).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

Deux oiseaux posés de nuit sur un chemin, le 13.8 à Leuk et le 18.9 à Saillon (beP; aAe), un trouvé mort écrasé le 20.8 à Raron (gCa), et une capture le 26.8 à Bretolet.

MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL

En dehors des sites connus de nidification, premiers signes de mouvement le 28.7 à Massongex (rV) et le 13.8 à Martigny (beP). Seulement quatre mentions de présence hivernale : le 24.12 à Martigny (beP), le 5.1 à Grône (R. Wenger) et les 7-9.1 aux Rigoles de Vionnaz (rV).

GUÉPIER, BIENEFRESSER

18 ind passent le col de Bretolet le 15.9 (jHa).





Des BÉCASSINES DES MARAIS ont séjourné cet hiver aux Rigoles de Vionnaz. – AQUARELLE EMILE SERMET

PIC-ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT

Chante le 27.10 à Mase, 1000 m (aSi).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE

Signalée entre le 30.12 et le 26.1 entre Collombey et Vouvry, où l'on relève une centaine d'ind les 17 et 26.1 (rV); en dehors de ce pôle, 50 oiseaux le 8.2 à Vétroz (aSi).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFRERSCHWALBE

Encore 5 le 13.10 au col de Bretolet (jCT).

PIPIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Isolés le 19.8 à Martigny (beP), le 22.8 sur Liddes, 2420 m (jGr, beP) et le 28.8 à Leuk (Rey); 2 le 31.8 à Raron (Sal).

PIPIPIT FARLOUSE, WISENPIEPER

Une plumée trouvée le 27.9 à St-Jean (beP) constitue la première mention automnale. Pour ce qui est de l'hiver, 6 le 8.12 à Raron (Sal), total de 27 ind le 5.1 en deux sites de Vionnaz (jCT), 6 le 5.2 à Martigny (beP) et 12 le 11.2 à Vouvry (G. Gilliéron).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Vingt et une mentions en décembre-janvier, dans la plaine entre le Bouveret et Visp, dont une de 23 ind le 30.12 à Turtmann (hDu), groupe important pour la saison; notons aussi douze le 3.1 à Collombey (nJ) et 6 le 17.1 à Vouvry (eS).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

Présence hivernale signalée en dix points de la plaine ou du coteau. Mention la plus en amont le 6.12 à Lalden (gWy).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

En plaine le 12.2 à Martigny (J.-L. Brahier), et au pied du coteau les 3 et 20.1 à Ardon-Chamoson (5-12 ind; eBe; liM), le 1.2 à Fully (3 ind; eRe) et le 9.2 à Salgesch (4 ind; Rey) et Sion (5 ind; hDu).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Un ind victime d'un chat le 21.9 à Ayent (S. Morand, St. Voisard).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

En dehors des sites traditionnels de présence hivernale, isolés le 11.12 à Vérossaz (paP) et le 13.12 à Bratsch, 1520 m (mBn).

TARIEP PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Séjours hivernaux incomplets rapportés à Vionnaz, où 1 à 2 ind sont vus entre le 4.1 et le 2.2 (nJ, eS, jCT), et Sion, où 1-3 ind semblent demeurer du début de l'hiver jusqu'au 20.1 (bM). En outre, nous relevons deux observations ponctuelles, le 24.12 à Martigny et le 16.1 à Dorénaz (beP).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

En plaine dès le 12.8 à Leuk (Rey), le 15.8 à Vouvry (rV) et le 20.8 à Martigny (hDu).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Concentrations hivernales à Vionnaz-Vouvry: 200 le 8.12 (eS), 280 le 30.1 (nJ) et 250 le 23.2 (eS, rV).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

3 les 30-31.10 dans les filets de Bretolet (mGe), une le 4.11 à Vérossaz (paP), une le 17.11 à Erschmatt (aSi), 2 le 30.12 à Chamoson (hDu), 2 le 5.1 à Sion (bM), une le 1.2 aux Rigoles de Vionnaz (nJ) et 2 le 26.2 à Savièse (bM).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

Une le 9.8 à Chamoson (hDu) et une trouvée morte le 3.10 à Zermatt suite à une collision contre une vitre (C. Gasser).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSDÄNGER

Mentions de 1-4 ind en provenance de Martigny, du 2 au 8.8 et les 2-3.9 (beP, hDu).

FAUVETTE ÉPERVIÈRE, SPERBERGRAMMÜCKE

Pour cette espèce très rare en automne, une jeune de l'année capturée le 3.9 à Bretolet (M. Schaad, H. Vögeli, S. Olschewski; CAvS).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRAMMÜCKE

A Martigny, 5 mentions de migratrices isolées entre le 6.8 et le 3.9 (beP).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRAMMÜCKE

En hiver, 2 le 30.12 à Lens et St-Léonard (hDu) et une les 6.1 et 5-14.2 à Sierre (Rey).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Huit mentions hivernales, de Vionnaz jusqu'à Baltschieder-Visp.

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

Un migrateur élevé le 20.8 sur Zermatt, 2450 m (E. Gunzinger).

MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE

En mouvement cette année: 686 captures au col de Bretolet, bilan annuel nettement supérieur à la normale.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE

Egalement une année d'invasion, attestée par les 308 captures de Bretolet.

TICHODROME, MAUERLÄUFER

A basse altitude, notons un les 5-15.10 sous Vex, 600 m (mTh), et un les 15.12 et 20.1 à Chamoson, 550 m (M. Fischer; liM, Val).

GRIMPÉREAU DES JARDINS, GARTENBAUMLÄUFER

Dans les filets de Bretolet le 10.10, événement inhabituel pour cette espèce sédentaire.

RÉMIZ, BEUTELMEISE

A Bretolet, 2 captures le 12.10 et 3 le 29.10 (mGe).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

A Vouvry le 5.10 (nJ), à Visp les 10-30.11 ainsi que le 5.1 (gWy; Ker, P. Keusch; Sal), à Agarn le 5.1 (R. Wenger).

CASSENOIX, TANNENHÄHER

Les 130 captures au col de Bretolet mettent en évidence des mouvements plus prononcés qu'à l'accoutumée (moyenne 1991-2001 = 21), de même que les 36 oiseaux signalés le 8.9 à Troistorrents (rV).

CRAVE, ALPENKRÄHE

Des max de 19 ind le 17.11 au-dessus d'Ardon (rA) et de 11 ind le 27.2 à Evolène, 2000 m (mTh). Sur le coteau, signalé à Conthey (max de 7 ind le 5.1; bM, nJ) et vers Leuk (max de 10 ind le 30.12; hDu).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Ind purs ou hybrides vus isolément le 10.8 à Dorénaz (beP), les 25.8 et 3.9 à Collombey (rV), le 26.8 à Ardon (hDu), le 27.11 à Martigny (beP) et le 20.1 à Issert, 1220 m, et sur Liddes, 2320 m (liM).

GRAND CORBEAU, KOLKRABE

Une cinquantaine le 8.8 aux Becs de Bosson dans le val d'Hérens, 3000 m (rLu).

ETOURNEAU, STAR

Encore 250 le 27.11 à Martigny (beP), puis vu par groupes de 15-30 ind le 5.1 à Sion, Ardon et Vionnaz (bM; jCT) et le 17.1 à Vouvry (eS).

MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING

Des troupes hivernales d'environ 150 ind le 28.12 à Collonges (nJ) et de 500-600 ind le 5.1 à Sion (bM).

NIVEROLLE, SCHNEESPERLING

Un groupe itinérant d'une ampleur exceptionnelle le 4.10 dans la région du Rawyl, 2380 m: environ 350 ind parcourant les surfaces exemptes de neige (M. Baudraz).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Un le 30.10 sur Conthey, 1450 m (beP), un les 20.1 et 6.2 à Sierre (Rey), 20-30 les 12-16.2 à Illarsaz (eS).

SERIN, GIRLITZ

Une centaine le 24.10 à Vionnaz (rV), puis sept mentions hivernales de 1-5 ind.

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Quatre mentions hivernales de 1-3 ind, à Fully et Conthey.

CHARDONNET, DISTELFINK

Cinquante-quatre mentions, comptant le plus souvent 1 à 15 ind, réparties entre le 1.12 et le 17.2, et concentrées dans le sillon rhodanien. Parmi elles, nous soulignons un groupe de quatre-vingt oiseaux le 9.1 aux Rigoles de Vionnaz (rV), et 3 ind relativement élevés le 12.1 sur Gampel, 1420 m (mBn).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

Deux regroupements hivernaux importants sont signalés: soixante le 8.12 à Bürchen (E. Bertouille) et trente-cinq le 3.1 à Rotafen (eBe).

BEC-CROISÉ, FICHTENKREUZSCHNABEL

Année d'invasion à Bretolet: total automnal de 2156 captures.

GROSBEK, KERNBEISSER

Relevons 1 ind le 24.11 à Hérémece (Gey) et 2 le 9.2 à Vollèges (beP), en marge de l'axe rhodanien où se concentrent la plupart des trente observations.

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Une quarantaine le 16.1 à Dorénaz (beP) et un le 16.2 à St-Luc, 1630 m (donnée élevée pour la saison; S. Antoniazza).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Dans les sites moins habituels pour l'espèce, notons 2 ind le 28.2 aux Rigoles de Vionnaz (jCT).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Retenons 4 ind le 5.1 à Sion (bM), 6 le 9.1 aux Rigoles de Vionnaz (rV) et au moins 15 le 5.2 à Martigny (beP).

Il arrive que LA PIE-GRIÈCHE GRISE hiverne en plaine valaisanne. Une offre alimentaire optimale est alors déterminante, telle celle que l'on trouve dans certaines jachères florales, riches en campagnoles. – AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER



MIGRATION DE PRINTEMPS ET NIDIFICATION EN 2003

La chaleur et la sécheresse exceptionnelles de l'année 2003 se manifestèrent dès le mois de mars (le plus ensoleillé depuis un demi-siècle), et atteignirent leur paroxysme avec les canicules historiques de juin et août, période où les températures dépassèrent de 4.6 à 6,1 °C les normes saisonnières. Ces conditions, hostiles aux hommes, aux arbres et aux cultures, permirent le succès de reproduction sans précédent de la **HUPPE** et du **TORCOL** en plaine, et furent probablement à l'origine des indices de reproduction extrêmement élevés enregistrés pour certaines espèces, dont la **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX**, la **FAUVETTE GRISSETTE**, le **SERIN** ou le **BRUANT ZIZI**. Encore dans les performances altitudinales, l'**ACCENTEUR ALPIN** réussit également un record, mais négatif! Des **PETIT-DUCS** furent à nouveau entendus dans le Haut-Valais, le **FULIGULE MORILLON** poursuivit sa progression à Grône tout en occupant de nouveaux bastions en altitude, et des densités remarquables furent relevées pour le **TARIER DES PRÉS** dans la haute vallée de Conches. Repérée en plusieurs points des Alpes suisses en plus de la région tessinoise, la **GORGEBLEUE** esquisse-t-elle également un retour dans les montagnes valaisannes? La saison migratoire printanière nous réserva quelques particularités, parmi lesquelles nous retiendrons trois observations de **VAUTOUR FAUVE**, et une fréquence inhabituelle de **CRABIERS**, comme dans le reste du pays.

FRUHJAHRZUG UND BRUTPERIODE 2003

Die ungewöhnliche Hitze und Trockenheit des Jahres 2003 begannen sich schon ab März, dem sonnenreichsten der letzten 50 Jahre, bemerkbar zu machen. Mit den historischen Hitzewellen im Juni und August erreichten sie ihren Kulminationspunkt, wurden doch die langjährigen Monatsmittel in diesen beiden Monaten um 4.6 bzw. 6.1° übertroffen. Diese Bedingungen, unter denen die Menschen, Bäume und Kulturen litten, gestatteten **WIEDEHOPF** und **WENDEHALS** in den Niederungen einen nie gesehenen Bruterfolg. Sie waren möglicherweise auch der Grund, weshalb es bei gewissen Arten wie **BERGSTELZE**, **DORNGRASMÜCKE**, **GIRLITZ** und **ZAUNAMMER** zu Brutversuchen in ungewöhnlicher Höhe kam. Daneben erzielte auch die **ALPENBRAUNELLE** einen Rekord, allerdings mit der bisher tiefstgelegenen Brut. **ZWERGOREULEN** wurden erneut im Oberwallis vernommen, die **REIHERENTE** festigte ihre Stellung im Marais de Grône und besetzte weitere alpine Vorposten. Beim **BRAUNKEHLCHEN** wurden im Goms bemerkenswerte Bestandsdichten erhoben. Beim **BLAUKEHLCHEN**, bei dem verschiedene Brutvorkommen ausserhalb des Tessins entdeckt wurden, fragt man sich, ob eine Rückkehr in die Walliser Alpen bevorsteht. Auch der Frühjahrszug brachte einige Spezialitäten mit, etwa drei Feststellungen von **GÄNSEGEIERN** und wie in den übrigen Landesteilen eine ungewöhnliche Häufung von **RALLENREIHERN**.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Premières observations printanières le 3.3 à Grône (2 ind; Rey) et le 8.3 à Martigny (beP). Reproduction certaine aux Rigoles de Vionnaz (eRe, eS), en 2 sites de Martigny (beP), au marais de Grône (4 c; hDu, Rey, Sal), à Sierre (jSa) et en 2 points de Finges (Rey); reproduction possible au marais d'Ardon, à Bramois et à Leuk (hDu, Rey).

GRÈBE HUPPE, HAUBENTAUCHER

1-3 migrateurs vus entre le 2.2 et le 14.3 à Grône-Granges (jmGa, bM, Rey). Dans le port du Bouveret, seize nids comptés le 21.5, dont treize couvés et trois en construction; première fam le 8.6 (C. Passarini).

CORMORAN, KORMORAN

Les mouvements semblent reprendre le 16.2 à Illarsaz (6 ind; eS) et le 23.2 à Conthey (bM). Par la suite, l'espèce est régulièrement signalée jusqu'au 27.4 à Turtmann (Rey), avec des max de 18 ind le 28.2 à Illarsaz (jCT), de 17 ind en dortoir le 10.4 à Martigny (beP) et de 15 ind le 16.4 à Leuk (cSi).

BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

Migrateurs isolés le 8.5 à Steg (cSi) et le 12.5 à Martigny (beP). Aucune preuve de reproduction, mais nidification possible à Montorge (1 ind le 26.6; X. Pistorius), Grône (1 ch du 12.5 au 30.6; hDu, pMo, Rey, jSa) et Leuk (1-2 ind vus de façon discontinue entre le 2.5 et le 23.6; cSi).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Vingt-quatre mentions printanières, dont 15 à Leuk, réparties en cette localité entre le 28.3 et le 23.5 (M. Zumbühl; H. Leuzinger), avec un max de 4 ind le 8.5 (cSi). En dehors de ce centre, isolés notés le 29.4 à Finges (Rey), les 30.4 et 9.5 à Grône (hDu, jmGa; Rey), les 6-7.5 à Raron (cSi) et le 10.5 à Sierre (jSa); suit un imm le 24.6 à Grône (jSa).

CRABIER, RALLENREIHER

Probablement 2 individus distincts à Leuk, avec escales respectives du 13 au 18.5 et du 29 au 31.5 (div. obs.), et d'autres isolés vus du 14 au 17.5 à Grône (hDu, R. Hauri, mPe) et le 17.5 à Finges (S. Meyer).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Hâtivement, 1-2 ind les 29-31.3 dans un BAC d'autoroute de Vétroz (hDu; M. Fischer). Puis: à Martigny, quatre mentions isolées de 1-2 ind entre le 12.4 et le 19.5 (jmD; beP); à Grône, 1-2 ind vus presque quotidiennement entre le 22.4 et le 3.5 (div. obs.); à Leuk, 2-5 oiseaux entre le 6 et le 10.5 (div. obs.) et encore 1 le 6.6 (beP); à Port-Valais, une le 13.5 (eRe).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

A Martigny, une le 12.4 et 2 le 2.5 (J. Curchod).

HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER

Treize des vingt-deux mentions proviennent de Leuk, et sont échelonnées entre le 28.3 et le 6.6 (M. Zumbühl; beP), atteignant des max de 6 ind le 16.4 et de 9 ind le 8.5 (cSi), groupes remarquables. Ailleurs, 1-2 du 24.4 au 1.5 à Grône (hDu, M. Fischer, mPe, jSa) et des isolés le 22.4 à Visp (Sal), le 27.4 à Chalais (jSa) et le 8.5 à Martigny (beP) et Steg (cSi).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Une le 29.3 à Collonges (beP, eRe), 5 le 20.4 à Vouvey (liM), et une du 9 au 13.5 à Leuk-Turtmann (beP, eRe; hDu; H.-R. Kunz).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un le 4.3 à Sierre (Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône, max printanier de 21 ind le 24.3 (Rey), puis mentions régulières jusqu'au 27.4 (2 ind; jSa). Au même endroit, 1 c le 12.6, sans autre indice de reproduction (Rey). Une seule observation en dehors de ce site, le 30.3 à Raron (5 ind; Sal).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Des fam sont observées sur Muraz, 1620 m (2 fam; nJ), à Vionnaz (rV), Monthey (2 fam; rV), Martigny (2 fam; beP), Derborence (Rz), Sion (3 fam; Rey), Grône, Granges (Rey, jSa), Finges et Leuk (Rey).



SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Deux premières le 14.3 à Martigny, dernière le 10.4 au même endroit (beP). Entre deux, retenons 4 ind le 22.3 à Sierre (Rey) et un max de 8 ind le 23.3 aux Rigoles de Vionnaz (rV).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENT

2 à Grône entre le 7 et le 16.4 (jmD, Rey), et 2 le 15.4 à Leuk (cSi).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENT

A Grône, 1-2 ind du 8 au 19.3 (Rey, jSa), puis un oiseau hors-saison le 2.6 (Rey).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Retour le 3.3 à Grône, où l'effectif nicheur poursuit sa progression: min de 11 fam comptées entre le 4 et le 29.7, et totalisant 64 juv (poussins comptés à l'âge de 4-12 jours; Rey). L'espèce est également mentionnée en 2 sites inédits d'altitude: un c le 5.6 à Champex (X. Petite), sans autre indice de nidification cependant, et une reproduction avérée à 1630 m dans la région du Grammont/Tanay, où jcT rencontre une fam avec 6 juv le 10.8.

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

2 premiers le 7.2 à Monthey (Rz), 5 le 15.3 remontant le val d'Illiez, 790 m, 2 le 23.3 à Vionnaz (rV), 2 le 13.4 à Vouvry (eRe) et 5 le 14.4 à St-Maurice (beP).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Premier le 9.3 à Vouvry (nJ). Attroupements dans les champs fraîchement labourés du Chablais: au moins 30 le 13.4 aux Evouettes (eRe) et 26 le 5.5 à Vouvry (hDu). La présence en période de nidification est rapportée jusqu'à Leuk, avec des mentions marginales à Miex le 24.6 (5 ind; eRe), à Salvan le 1.6 (eRe), et à Champéry le 31.5 (aBa). Un non-nicheur erratique probable le 15.6 au Simplon, 2100 m (pKn).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Un les 15 et 23.2 à Chamoson (jmGa; eRe), puis total de quinze mentions (dont onze du Bas-Valais) jusqu'au 25.5; parmi elles, nous retenons celles de 3 ind le 24.4 à Vionnaz (rV) et d'un ind le 10.5 à Mex, 1140 m (nJ). Plus tard, un erratique le 19.6 sur Lax, 2850 m (mEg).

GYPAËTE BARBU, BARTGEIER

A part le c centré sur la région de Derborence, et en dehors des secteurs habituellement fréquentés par l'espèce, des observations en provenance du haut val de Bagnes (B. Gabbud, V. May, M. Planchamp) et du val d'Entremont (Valsorey et Combe de l'A; sMe; T. Roduit) jusqu'au 8.6, vraisemblablement dues en bonne partie à un même imm.

VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

Trois mentions homologuées par la CAVS: le 10.5 sur Champéry, 1900 m (D. Querio), le 30.5 sur Greich et Bratsch (Chr. Marti; G. Sieber, pOg et al.) et le 29.6 à Oberwald (M. Ruffieux et al.).

CIRCAËTE, SCHLANGENADLER

Année bien maigre: isolés les 3 et 31.5 à Leuk (hDu; U. Glutz von Blotzheim), le 15.6 sur Evionnaz, le 28.6 à Saillon (nJ) et le 30.6 à Fully (E. Rey).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Migrateurs le plus souvent isolés observés entre le 29.3 à Lens (hDu) et le 24.6 à Leuk (cSi), majoritairement à Leuk et Grône. Événement rare, un oiseau estive en ce dernier site du 12.6 au 7.9 (Rey, hDu, jmGa, jSa).

BUSARD ST-MARTIN, KORNEWIHE

Abondance de données en mars, probable retombée de la forte présence hivernale: en plaine bas-valaisanne dans le Chablais (div. obs.) et à Doréaz (nJ); sur le coteau à Fully (eRe), Saillon (aAe) et Arbaz (aSi); dans le Haut-Valais, nous retenons un ind le 3.3 à Filet, 1300 m (C. Katzenmaier), un le 30.3 à Visp (Sal) et un le même jour à Erschmatt, 2200 m (jcT). Dès avril et jusqu'au 6.5, l'espèce est presque vue uniquement dans le Chablais, où 1-2 ind semblent retenus par l'abondante offre en nourriture d'un petit nombre de jachères florales (nJ, liM, eRe, rV). Un m tardif le 21.5 à Rotafen (liM).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Vu à Leuk les 15-16.4 (cSi), du 9 au 11.5 (1-2 ind; div. obs.) et le 30.5 (sEh); à Leytron le 20.4 (hDu).

BALBUZARD, FISCHADLER

A Leuk, un le 12.4 (aSi, S. Morand, St. Voisard) et un les 20-21.5 (M. Roost; liM).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

8 c repérés en plaine (bas coteaux non compris) entre le Léman et Sierre, dont 5 installés en nichoir (Illarsaz, Monthey, Charrat et Chalais) et 2 sur des bâtiments industriels, à Collombey et Charrat (eRe, beP SOS VS). Le 19.8, quatre territoires comptés sur 4 km au-dessus de Collonges-Doréaz-Fully, 2300 m (eRe).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Au moins un ind signalé du 2 au 20.5 à Collombey-Vionnaz (nJ, beP, eRe), 1-4 ind régulièrement vus à Leuk entre le 1.5 et le 18.5 (div. obs.), et isolés le 8.5 à Niedergesteln (W. Christen), le 15.5 à Raron (cMo) et le 18.5 à Ausserberg, 1100 m (Ph. Frei).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Retour le 23.4 à Grône (Rey), puis nous retenons les migrants suivants: le 1.5 sur les hauts de Choëx, 1300 m (P. Albrecht), le 27.5 à Nax, 1300 m (rA), le 29.5 sur Monthey, 600 m (rV), le 1.6 sur St-Martin, 2700 m (gCa). Des mentions les 27-29.6 à Vionnaz-Collombey (eRe; rV), ainsi qu'en mai et le 6.7 à Grône (Sal) constituent les seuls indices d'éventuelles nidifications. Un erratique le 20.7 à Greich, 1900 m (aBa).

TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN

Une vingtaine d'ind le 30.3 sur Guttet, 1900 m (jcT).

CAILLE, WACHTEL

Très peu signalée. Entendue uniquement dans la plaine de Leuk-Gampel, excepté 1 ch le 8.5 à Raron (cSi) et 2 ch erratiques le 7.7 sur Albinen, 2350 m (eRe).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

Belle concentration de 5 ch le 13.3 à Vionnaz (eS); également entendu à Martigny (beP), Finges (A. Borgula, Rey) et Grône (hDu, Rey, Sal, jSa).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN

Au moins 6 ind différents s'arrêtent à Martigny entre le 26.3 et le 18.4 (beP).

MARQUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFHUHN

Une le 12.5 à Leuk (hDu).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Se reproduit de façon certaine à Monthey (rV), Martigny (3-4 c; hDu, liM, beP), Saillon (3 c; hDu), Grône (3 c; hDu, Rey, Sal), Sierre et Finges (Rey).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

Cinq nids sur les amarres de bateaux au port du Bouveret le 21.5 (C. Passarini). En altitude, une fam le 5.6 à Champex, 1450 m (X. Petite) et une en juillet-août à Derborence, 1450 m (Rz, eRe).

OEDICNÈME, TRIEL

Un le 28.4 à Gampel (hDu).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

En migration, un le 6.4 à Conthey (cB, bM) et un le 2.5 à Martigny (hDu). Nidification localisée au Rhône de Finges (J. Gremaud, R. Kunz, Rey).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Deux premiers le 23.2 à Sion (bM), puis notons 51 ind le 2.3 à Vouvry (nJ), 34 le 3.3 à Martigny (beP), 27 le même jour à la hauteur de Réchy (jmGa) et une vingtaine le 8.3 à Vétroz (yCr). A partir de début avril, l'espèce n'est signalée plus qu'à Vouvry, où 1-2 c tenteront de s'installer malgré la sécheresse, sans succès (nJ, eRe, eS).

BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING

Un le 18.5 au Bouveret (hDu).

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

Un le 30.3 à Vouvry (jmD).



J. Fournier
Les Follatères
21.05.2004

Mâle de FAUVETTE PITCHOU,
les Follatères, le 21 mai 2004.



J. Fournier
Les Follatères
23 mai 2004

Mâle de FAUVETTE PASSERINETTE,
les Follatères, le 23 mai 2004.

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Presque inaperçue : isolées les 1-8.3 à Martigny-Fully (beP) et le 13.4 à Vionnaz (eRe).

Bécasse, Waldschnepfe

Deux le 30.3 sur Feschel, 1640 m (jCT), peut-être en mouvement, et croule entendue le 15.7 sur Troistorrents (St. Pellaud).

COURLIS CENDRÉ, GROSSERBRACHVOGEL

3 ind font escale le 23.3 à Vouvry (rV).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un le 22.4 au bord du Rhône de Baltschieder (Sal).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Premier le 19.3 à Grône et deux derniers le 27.4 à Sierre (jSa).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Un les 28-29.4 à Martigny (beP), 1-2 les 5 et 12.5 à Grône (hDu) et 1-2 du 7 au 15.5 à Leuk (hDu, cSi).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

En juin-juillet, dans ses bastions traditionnels de Finges (div. obs.) et Goms (Geschinen et Gluringen; cSi; Zur).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

2-4 ind les 6 et 12.5 à Grône (Rey; hDu) et une le 13.6 sur le Rhône de Leuk (beP).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

En dehors de la basse plaine, 6 le 3.6 à Vernayaz (beP).

STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE

10 le 29.5 à l'embouchure du Rhône (E. Rey).

GUIFFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Une les 30.4 et 1.5 à Grône (hDu, mPe, Rey; M. Fischer).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

2 migrateurs le 3.4 à Martigny (beP) et un ch le 19.6 à Muraz (jCT).

TOURTERELLE TURQUE, TÜRKENTAUBE

Mis à part sa présence traditionnelle à Zermatt (moJ), une autre donnée élevée, le 26.5 à Blatten, 1540 m (A. Borgula) : une première pour le Lötschental ?

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Quelques mentions de ch isolés : le 29.5 dans la plaine de Port-Valais (eRe), le 2.6 à Vouvry et le 6.6 à Leuk (beP, eRe).

COUCOU, KUCKUCK

Premier le 17.4 à Brentjong (P. Bonfils). En plaine, entendu à Leuk (div. obs.), Finges (A. Borgula, Rey), Grône-Granges (hDu, Rey) et Vionnaz (eS).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

6 nichoirs occupés, dans la basse plaine et à Fully-Charrat, dont au moins 4 avec nichée réussie. Aucun indice de visite dans les nichoirs posés entre Saxon et Sierre (eRe, beP SOS VS).

PETIT-DUC, ZWERGOHREULE

Deux sites avec reproduction dans le noyau central Arbaz-Ayent, et 5 sites occupés (mais sans preuve de reproduction) dans le Haut-Valais : Gampinen, Lalden, Ried-Brig, Stalden et Gantertal (aSi SOS VS, pOg et al.).

GRAND-DUC, UHU

4 sites de reproduction en plaine, dont 3 avec des juv à l'envol, ainsi qu'un ch en montagne (aAe, rA Uni BE et al.). Des plumes trouvées le 19.7 dans le val d'Anniviers, 2550 m (Ph. Werner) et le 29.7 dans le Zwischbergental, 2040 m (gCa).

CHEVÉCHETTE, SPERLINGSKAUZ

Signalée le 27.2 sur Nendaz (M. Chapuis), le 9.3 sur Evolène (Gey), le 13.4 sur Liddes (1 c; B. Gabbud), le 27.7 sur Törbel (1 juv; Sal), le 5.8 sur Oberwald (jCT), le 20.9 sur Champéry (cSi) et le 27.9 dans la forêt d'Aletsch (3 ch; M. Rudin).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

Un migrateur levé le 10.5 à Ried bei Brig (J.-F. Burri). Les données de ch proviennent presque toutes du coteau entre Salgesch et Ausserberg (div. obs.). Ailleurs, un ch le 8.6 à St-Léonard (le seul de l'année dans tout le secteur; M.-Th. Sangra par aSi), et un ch vraisemblablement solitaire le 11.7 à Aven (gCa).

MARTINET NOIR, MAUERSEGLER

Arrive le 13.4 : 3 à Vouvry et 2 à Grône (nJ; Rey).

MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL

Grône est le seul site avec reproduction certaine (nourrissage le 9.5; Rey). Autres mentions en période de nidification : isolés le 6.4 à Sierre (jSa), le 11.4 à Illarsaz (eRe), les 30.5 et 6.6 à Finges (R. Kunz, Rey) et le 7.6 aux Rigoles de Vionnaz (nJ).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

12 en vol aval le 25.4 à Salgesch (B. Dufour).

HUPPE, WIEDEHOPF

Première le 21.3 à Réchy (jmGa), mais l'espèce ne devient régulière qu'à partir de la mi-avril. Année record pour la reproduction des huppées de plaine installées en nichoirs : entre le coude du Rhône et Sierre, 56 nichées produisent un total de 331 juv à l'envol; par contre, aucun nichoir occupé dans les secteurs Vernayaz-Martigny et Sierre-Turtmann (aSi, rA et al. SOS VS/Uni BE). Nous notons encore une reproduction avérée à Chermignon (Rey, aSi), et des nidifications certaines ou possibles en 5-6 points du Haut-Valais, dont celui de Rotafen-Guttet, où 2-3 ch sont entendus les 10-11.5 (R. Béguelin; F. Schneider). Les huppées valaisannes s'exilent aussi : un ind bagué en 2001 à Fully est retrouvé tué par un chat en Slovénié le 13.5.02, à 530 km de son lieu de naissance; un autre oiseau bagué en 2002 à St-Léonard est retrouvé mort sur une route d'Ardèche le 9.4.03, à 278 km du Valais.

TORCOL, WENDEHALS

Deux premiers très en avance le 14.3 à Baltschieder (Ker), puis normalement dès le 29.3 à Martigny (hDu, beP). 80 nichoirs occupés dans les vergers de plaine (Vernayaz-Sierre), dont la grande majorité entre Martigny et Conthey, pour un total de 90 nichées permettant l'envol de 364 juv, chiffres supérieurs à ceux de 2002 (sEh, Sch, aSi Uni BE & SOS VS). Données les plus en aval : ch le 13.4 à Vionnaz, le 20.5 à Collombey et le 2.6 à Collonges (2 ch) (eRe). Dans les vallées latérales, relevons un ch le 31.5 à Blatten (M. Burkhardt).

PIC ÉPÉICHETTE, KLEINSPECHT

Uniquement le long du sillon rhodanien, en plaine ou sur le coteau. Les ch les plus élevés sont entendus les 11-12.3 à Vex, 1070 m (Gey), le 24.6 sur Gampel, 1280 m, et le 25.6 à Arbaz, 1040 m (cSi).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

2 m le 23.4 sur Ravoire, 1900 m (M. Défago).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE

Quatre mentions en provenance de Leuk, entre le 24.4 et le 11.5 (hDu, cSi); par ailleurs, une le 6.5 à Vouvry (eRe) et une le 22.5 à Raron (hDu).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Sur l'adret, entendue à Savièze (bM), Lens (aSi), puis entre Salgesch et Gampel. En rive gauche, 6-7 territoires à Bürchen-Zeneggen (aGa) et un ch le 9.6 sur Törbel, 2070 m (Zur).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Première le 21.3 à Evionnaz (nJ).

HIRONDELLE ROUSSELIN, RÖTELSCHWALBE

Une les 21-22.5 à Martigny-Fully (hDu, cSi; CAVS).

PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Entre le 1 et le 30.5 à Leuk et Raron principalement, avec un max de 8 ind le 8.5 dans le deuxième site nommé (hDu, cSi). En dehors de ce secteur, isolés le 9.5 à Termen (hDu) et le 11.5 à Sierre (jSa).

PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

1-2 les 24-25.4 et 1-6.5 à Leuk (cSi), et 1 le 3.5 à Vouvry (nJ).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

Suite à des chutes de neige en altitude, au moins 500 le 10.4 entre Vouvry et Muraz (rV).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFFSTELZE

Au plus fort de la migration, à noter 140 oiseaux le 6.5 entre Leuk et Raron (cSi). En juin, 18 territoires comptés entre Vouvry et Collombey (eRe SOS VS).



Jeune CHOUETTE CHEVÊCHETTE. – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, BERGSTELZE

Des ad nourrisent au nid le 8.7 sur Zermatt, 2360 m (mEg, kEi), la plus haute reproduction jamais certifiée en Suisse. Autres mentions élevées: un ind le 25.6 sur Visperterminen, 2300 m (Ph. Frei), un le 27.6 à Arben/Zermatt, 2450 m (jcT), un le 14.7 sur Leytron, 2150 m (M. Wettstein) et des nourrissages le 31.5 au-dessus de Sarreyer, 2000 m (Th. Sattler).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Une preuve de reproduction extrêmement basse: un ind avec juv prêts à l'envol découvert le 9.8 à Salvan, 1235 m (cB).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Un ch extrêmement hâtif le 30.3 à Vouvry (nJ; CAVs), puis dès le 15.4 à Martigny (beP, cSi). Entre autres comptages, 12 ch le 8.5 sur 1 km de berges du Rhône à Raron (W. Christen).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Deux différentes les 24-25.3 à Martigny (beP), une le 28.3 à Leuk (M. Zumbühl), et un ch de la ssp à miroir roux le 11.6 sur Zermatt, 2580 m (moJ), premier cantonnement valaisan avéré depuis les années 1980.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Premiers le 29.3 à Leuk (jcT) et le 6.4 à Martigny (eRe), puis régulier dès le 15.4. Sur l'année, les trois quarts des mentions proviennent du Haut-Valais. En aval de Salgesch, soulignons une nidification certaine au-dessus de la ville de Monthey, 680 m (alB), et seulement quatre territoires comptés dans les villages de Salvan, des Marécottes et du Trétien (A. Jacquier, eRe).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Concentration remarquable relevée dans la haute vallée de

Conches, où l'espèce profite encore des fauches tardives et du morcellement des parcelles: quarante-huit territoires comptés sur 90 ha de prairies entre Münster et Geschinen, probablement une des densités les plus élevées de Suisse (beP, eRe, aSi SOS VS). En plaine de Leuk, dix-huit territoires pour une surface de 2,37 km² (beP, eRe SOS VS). Ailleurs en plaine, 1 ch le 19.6 dans l'enceinte de la raffinerie de Collombey, une nidification certaine dans une jachère florale de Vionnaz (eRe), une tentative de reproduction à Martigny (eRe) et des ch entendus les 12 et 27.5 à Chalais-Sierre (aSi).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Retour le 28.2 à Vionnaz (jcT) et le 3.3 à Martigny (beP). Concernant la nidification dans le Valais romand: 15 territoires entre le Léman et Collombey, 19 territoires entre Evionnaz-Collonges et Fully-Charrat (eRe, beP SOS VS), 2 territoires le 5.5 à l'aéroport de Sion (hDu), 1-2 à Uvrier-St-Léonard (Sch, aSi) et 4 les 30.5 et 6.6 à Chalais-Sierre (beP, jSa). Pour le Haut-Valais, soulignons 17 territoires sur 2,37 km² à Leuk-Turtmann (densité de 7.17 c/km²) (eRe, beP SOS VS).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Arrivée relativement tardive, à partir du 10.4 à Martigny et Collombey (beP; rV). Deux cantonnements élevés le 7.6 au-dessus de Täsch, 3100 m (jcT).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÔTEL

Retenons une nidification certaine à Chamoson, 600 m (div. obs.), la seule à basse altitude, et une fam le 26.8 au-dessus de Miex, 1860 m (jcT), seule donnée en aval du coude du Rhône.

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Deux c se reproduisent à Chamoson (div. obs.)

MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL

Un en plaine le 3.4 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

Vue ou entendue entre le 24.4 et le 19.5.

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHSÄNGER

Vu entre le 21.4 et le 16.5, une seule fois hors Haut-Valais. Soulignons les escalas massives du 8.5: 37 ind (!) à Leuk et 8 à Raron (cSi).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFRÖHRSÄNGER

Dans le Haut-Valais, 8 ch le 22.5 à Leuk (cSi), 4 le 6.6 à Turtmann (beP) et 5 le 11.7 dans les prairies de Münster (eRe); dans le centre, 2 ch les 8 et 10.7 à Chamoson et Riddes (eRe; sEh); dans le Bas-Valais, retenons 3 ch en juin le long du Tonkin entre Vouvy et Collombey (nJ, eRe), et de nouveaux cantonnements dans les mégaphorbiaies de l'Entremont: ch les 21-22.6 à la Fouly, 1630 et 2000 m (nJ; A. Scheurer).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHRÖHRSÄNGER

Au plus fort du passage, au moins 10 ind le 6.5 à Raron et 30 ind le 7.5 à Leuk (cSi). Par ailleurs, une erratique chante durant deux semaines à fin mai-début juin dans un jardin de villa à Vernayaz (jeF).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHSÄNGER

Entendue quatre fois à Leuk entre le 7.5 et le 1.6 (cSi; R. Kunz), à Raron les 6-8.5 (cSi), à Granges le 6.5, à Grône le 9.5 (Rey).

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Une les 3-4.5 à Fully (hDu), et mentions réparties entre le 3 et le 16.5 à Leuk-Gampel-Raron, avec un total max de 7 ind le 8.5 (cSi).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Données de plaine hors Leuk-Turtmann: dans le Chablais, 1 ch le 22.5 à Collombey, 1 ch le 29.5 à Vouvy et 2 ch les 27-30.6 à Vionnaz, dont un dans une jachère florale (eRe); 2 ch le 18.5 dans des friches industrielles de Martigny (beP), et 1 ch les 23-26.5 à Bramois (Sch; aSi).

FAUVETTE ÉPERVIÈRE, SPERBERGRASMÜCKE

1 ch du 16 au 23.5 à Rotafen (eRe, beP et al.).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Belles densités de 11 ch sur 1 km² le 30.5 dans la région du Simplon, 2100 m (pKn), et de 18 ch sur 3 km² le 1.6 sur Zermatt, 2020-2220 m (jCT). En plaine, une mention isolée d'un ch le 27.6 à Grône (Rey).

FAUVETTE GRISSETTE, DORNGRASMÜCKE

En migration, au moins 15 ind le 8.5 en plaine de Leuk et Raron (cSi). Par la suite, nous retenons 1 ch les 8 et 18.5 à Martigny (beP), 1 ch les 20-22.5 à Vionnaz (eRe), 2-3 ch le 30.5 à Chalais-Sierre (pMo, beP, jSa), 1 ch les 6 et 23.6 en plaine de Leuk (nouveau; eRe; cSi), 1 ch exceptionnellement élevé le 22.6 à Ried-Mörel, 2150 m (P. Albrecht), et 2 ind le 5.8 sur Zermatt, 2200 m (G. Oesterheld), à l'endroit exact où un ch avait déjà été noté en juillet 1999 (L. Lückler).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

En aval du coude du Rhône, 3 ch les 29-30.6 à Vionnaz, 420-800 m (eRe). Dans les principaux bastions, retenons quelques concentrations intéressantes: 12 ch le 4.5 le long du bisse de Varen (Sal), 33 ch le 1.6 sur 4 km² au-dessus de Zermatt, 1900-2120 m (jCT), et 12 ch sur 1 km² à Evolène (mTh). Une observation élevée hors secteurs d'altitude traditionnels: 1 ch le 11.5 sur les hauts de Fully, 2250 m (beP).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Apparaît le 19.4 à Saillon (aAe). En dehors de la forêt de Finges, des ch sont entendus dans le secteur du Trient: 1 le 4.5 à Gueuroz, 2 le 18.5 à Salvan et un le 28.5 au pied du mont d'Ottan (Martigny; eRe).

POUILLOT FITIS, FITIS

Dès le 6.4 à Grône et Martigny (bM; eRe). Notons une vingtaine le 20.4 à Fully (cSi), et des ch probablement non appariés le 29.5 à Oberwald (beP) et le 11.6 sur Montana, 2000 m (Rey).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

En migration, au moins 20 le 6.5 à Raron (cSi). En période de nidification, un ch élevé le 16.6 sur Blatten, 2080 m (pKn), et crie le 13.7 sur Fully-Saillon, 2080 m (M. Wettstein).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

Un le 6.7 à Grône (Sal), nicheur potentiel ou migrateur hâtif.

TICHODROME, MAUERLÄUFER

A basse altitude, en dehors du site traditionnel de Rotafen, 2 le 23.6 à Gampel, 680 m (cSi).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

2 bien hâtives le 23.2 à St-Léonard (cB), un ch le 10.4 au même endroit (jmGa) et 2 le 15.4 à Martigny (cSi).

LORIOT, PIROL

En migration, retenons des ch élevés le 11.5 à Vernamiège, 1540 m (mTh) et le 28.5 à Zermatt, 1750 m (aSi). Quant à la population nicheuse du canton, elle semble se restreindre essentiellement à celle du Chablais: 1 ch le 29.5 à la colline des Evouettes, et 9-10 territoires sur environ 4 km² dans les bandes boisées et bosquets de Collombey-Vionnaz (eRe). Les ch de juillet entendus à Grône et Leuk (Rey) sont probablement des migrateurs en escale.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Arrive le 2.5 à Ardon (hDu). En plaine, relevons 9 territoires entre Collombey et Vouvy, 13 au coude du Rhône entre Evionnaz et Charrat (eRe SOS VS; nJ, eRe), et 4 sur 1 km² à Lalden (gWy). A l'étage montagnard, 19-23 fam comptées le 15.7 sur 3 km² à Bürchen-Zeneggen (aGa), densité remarquable.

PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARZSTIRNWÜRGER

Une le 20.5 à Agarn (hDu; CAVS).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Une le 3.5 à Leuk (cSi).

CHOUCAS, DOHLE

4-5 c installés dans le clocher de l'église de St-Maurice (beP, eRe), et présence signalée dans la vieille ville de Brig (eRe). Toujours pour la reproduction, mais au stade des indices: 5 ind le 29.3 dans un bois de Collonges (beP, eRe), et un le 29.5 à Münster (beP).

CORNELLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Quelques apparitions en aval de Finges: les 9.3 et 8.5 à Collombey (nJ; eRe), les 28.4 et 23.5 à Sion (hDu; nJ) et le 25.6 à Ardon (3 ind; cSi).

ÉTOURNEAU, STAR

Retour perçu dès le 11.2 à Sierre (15 ind; Rey), puis nous retenons 150 ind le 20.2 à Vouvy (rV).

MOINEAU CISPALPIN, ITALIENSPELING

Ind signalés à Sion, Sierre, Leuk, Evolène, Grimontz, Kippel et Zermatt.

PINSON DU NORD, BERGFINK

Un le 2.3 à Bovernier, 1030 m (bV), et 2 derniers le 3.4 à Vouvy (nJ).

SERIN, GIRLITZ

Une nidification certaine très élevée signalée au-dessus de Goppisberg, 1910 m, sur un site déjà occupé en 1999 (U. Glutz von Blotzheim, kEi).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, isolés signalés le 17.6 à Fully (liM), les 25-27.6 à Chamoson-Ardon (cSi; pMo) et le 26.6 à Sierre (pMo).

GROSBEK, KERNBEISSER

Extrêmement discret: une nidification suspectée à Vérossaz (beP) et une fam le 24.6 sur Gampel (cSi) constituent les seules mentions en période de reproduction.

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Un ch le 6.4 sur le coteau du Rosel à Dorénaz (beP), site inédit, seule mention de basse altitude en dehors du Haut-Valais.

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Le noyau principal se limite au secteur de coteau entre Varen et Ausserberg. Ailleurs, un ch sur Monthey, 680 m (alB), 2 ch en plaine de Martigny-Vernayaz (jeF, eRe), 1 ch



à Lens (aSi) et 1 ch exceptionnellement élevé le 8.6 à Leukerbad, 1680 m (B. Lugrin).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Une nidification certaine signalée sur Miex, 1900 m (jCT), la seule dans le Chablais.

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Premier le 16.4 à Leuk (cSi). En migration, 1 le 23.4 à Bûrchen (aGa), 3 le même jour à Lalden (gWy) et 2 le 28.4 à Vétroz (hDu); en erratisme, 1 ch le 11.6 à Riddes (pMo), dans une zone non favorable. Concernant les ind cantonnés: 1 ch le 24.5 à Commeire/Orsières, 1380 m (beP), une dizaine de ch le 7.6 à Leuk (aBa), 2 ch les 29-31.5 à Erschmatt, 1500 m (R. Kunz; pOg), 1 ch le 23.6 à Niedergesteln (cSi) et 2 ch le 9.7 à Zermatt (kEi).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

3 territoires dans la plaine de Leuk-Turtmann (eRe, beP SOS VS).

AUTOMNE 2003 • HIVER 2003/2004

Encore exceptionnelle en Valais il y a quelques années, la **GRANDE AIGRETTE** fait désormais partie des visiteurs réguliers: les nouveaux records de présence de l'espèce enregistrés au niveau suisse eurent aussi leurs échos en Valais, principalement dans le Chablais. En hiver, les tendances ne furent pas les mêmes pour tous les fringilles: alors que **CHARDONNETS** et **LINOTTES**, parfois rassemblés par la neige en groupes importants, furent bien signalés, le **SERIN** passa complètement inaperçu. La basse plaine se démarqua notamment par le bon hivernage du **PIGEON RAMIER**, de l'**ALOUETTE DES CHAMPS** et de la **BERGERONNETTE GRISE**; le Valais central par la présence hivernale du **MONTICOLE BLEU** et le séjour d'un **BRUANT NAIN**, qui provoqua un certain émoi chez les ornithologues de tout le pays...

HERBST 2003 • WINTER 2003/2004

Vor wenigen Jahren noch eine Ausnahmerecheinung, gehört der **SILBERREIHER** im Wallis mittlerweile bereits zu den regelmässigen Gästen: Neue nationale Höchstzahlen hatten auch im Wallis, namentlich im Chablais, ihren Widerhall. Die Winterbestände der Finkenvögel zeigten unterschiedliche Tendenzen: Während **DISTELFINKEN** und **HÄNFLINGE** sich manchmal wegen des Schnees zu grossen Trupps zusammenscharten, blieb der **GIRLITZ** völlig aus. Der unterste Talabschnitt zeichnete sich vor allem durch grössere Winterzahlen bei **RINGELTAUBE**, **FELDLERCHE** und **BACHSTELZE** aus. Das Mittelwallis brillierte mit einem Winteraufenthalt der **BLAUMERLE** und einer **ZWERGAMMER**; letztere sorgte für eine ziemliche Aufruhr unter den Ornithologen des Landes...

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Vu sur les divers sites de reproduction jusqu'au 5.12, puis 2 du 25.1 au 22.2 à Vouvry (rV).

GRÈBE JOUGRIS, ROTHALSTAUCHER

Un oiseau séjourne entre le 1^{er} et le 10.2 au Bouveret (jmGa, beP, jSa; nJ).

CORMORAN, KORMORAN

Réapparaît dès le 15.7 à Grône (Rey). En migration

automnale d'altitude, 2 le 13.9 sur Evolène, 3000 m, et 3 le 16.9 dans le secteur de la Rosablanchette, 2600 m (paO). En hiver, seize mentions du 5.12 au 12.2 entre Collombey et Baltschieder.

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

4-8 ind s'installent à Monthey dès le 4.1 (rV); à Granges, 1 les 7-11.1 puis 3-4 les 1 et 18.2 (Rey); 4 le 11.1 à Illarsaz (rV), et 1-2 du 17 au 31.1 à Martigny (beP).

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHEREIHER

Un du 15 au 19.10 à Collonges-Dorénaz (M. Maibach, J. Pasche, jeF).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

A Grône, une le 4.7 (Rey) et 1-2 du 25.10 au 9.11 (div. obs.). En hiver, plusieurs ind signalés entre le 26.12 et le 6.2 dans les champs de la basse plaine, avec un max de 10-11 oiseaux du 14 au 18.1 à Vouvry (nJ, rV), chiffre record pour le canton.

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Retenons les groupes les plus importants: à Grône, 15 ind du 11.11 au 3.12 (Rey, Sal) et 12-13 ind les 11-14.1 (Rz, Rey); entre Vouvry et Monthey, total de 21 ind le 23.11 (rV).

Héron pourpré, Purpurreiher

Un le 26.7 à Grône (eBe).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

4 ind passent le col de Bretolet entre le 14 et le 17.9 (J.-J. Beley, jHa, Sal), et vue à deux reprises sur Evolène, le 7.8 et le 14.9 (E. Calatayud; paO).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

5 les 21-22.7 à Granges (J. Crettaz; J. Stalder), vues le 22.8 en en vol sur Fully-Charrat (D. Carrard), et une le 3.9 à St-Léonard (Rey).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Présent durant tout l'automne/hiver à Illarsaz, où les effectifs se renforcent: ils atteignent des pointes à 48 ind les 9-13.11, 62 ind du 14 au 28.12, 76 ind le 30.1 et 78 ind les 10-12.2 (eS, rV).

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Un le 3.12 à Grône (Rey).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

2 le 2.10 à Grône (hDu).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

5 le 11.12 à Martigny (beP), et 1-4 ind qui séjournent à Monthey entre le 4.1 et le 11.3 (rV).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Vue à Grône-Granges depuis le 18.8 (Rey), avec des pics à 30 ind les 26-28.10 (jSa; mPe) et 25 ind le 7.1 (Rey). Ailleurs, 2-3 ind entre le 17.10 et le 5.11 à Martigny (beP; hDu), une à Sierre les 16-21.10 (jSa), 2 le 29.11 à Leuk (hDu) et 3 le 4.1 à Vionnaz (rV).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

A noter une septantaine le 14.12 à Grône (jSa).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

2 les 4 et 8.7 à Grône (aGe, Rey) puis 6 le 12.9 à Leuk, où un ind est encore observé les 16-23.9 (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

A Grône les 6-7.8 et 15.10 (Rey), et total de 14 ind le 23.11 à Monthey et Illarsaz (rV).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Les fam de Grône quittent le site en septembre-octobre, et un dernier ind y est vu le 3.12 (Rey). En migration, 10 le 23.11 à Monthey et 34 le même jour à Illarsaz (rV); plus tard, un le 1.2 à Granges (Rey), seule mention hivernale.

HARLE PIETTE, ZWERGSÄGER

2 ind le 4.1 à Monthey (rV).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Vingt observations de 1-5 ind étalées entre le 6.1 et le 28.3, toutes entre Vouvry et le coude du Rhône, excepté 5 ind les 28-29.2 à Sierre (jSa).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Un le 14.9 sur Bourg-St-Pierre, 2520 m (N. Rieille, beP).



MILAN ROYAL, ROTMILAN

Des mentions estivales le 27.7 à Vionnaz (rV) et le 5.8 sur Emosson, 2800 m (Val). En automne, nous retenons un total de 62 migrateurs à Bretolet, pratiquement tous signalés entre le 12 et le 30.9 (jHa et al.), 4 ind le 26.9 à Vérossaz (S. Biollay) et deux derniers le 25.10 à Evionnaz et Martigny (V. Revaz; A. Scheurer).

BONDÉE, WESPENBUSSARD

Les passages les plus marqués sont enregistrés le 14.9 avec 48 migratrices à Bretolet (Sal) et le 25.9 avec encore 48 oiseaux sur ce même col (jHa) et 20 sur Trient, 2100 m (eMo). Notons aussi 5 de ces rapaces le 14.9 sur Liddes et Bourg-St-Pierre, 2400-2520 m (beP, eRe).

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Le c de Derborence, qui poursuit ses joutes régulières avec les Aigles royaux, est rejoint dans son secteur par Life, un imm qui effectuera 2 séjours sur les hauts de Ardon-Conthey, du 15 au 19.10 puis du 26.11 au 8.12 (div. obs.), et qui sera revu le 16.3 sur Liddes (sMe). Trois mentions dans les préalpes chablaisiennes, dont celles de Transalpaete (lâché en 2003) le 20.11 dans la région des Jumelles/Vouvry (R. Clerc) et d'un imm qui «flirte» avec la plaine le 23.1 à la Porte du Sex (L. Bassin). Relevons également un oiseau le 16.9 sur Hérémece (G. Lamon) et deux mentions automnales dans le secteur Bagnes/ Entremont. Dans le Haut-Valais, un ind le 17.9 sur les hauts de Naters (E. Zbären), seule mention hors Leukerbad.

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Derniers en plaine le 8.10 à Sierre et le 16.10 à Vouvry (Rey; rV), à Bretolet le 25.10 (mGe).

BUSARD ST-MARTIN, KORNEWIHE

Premier migrateur le 12.9 à Bretolet (eMo). Dans la basse plaine, présence de 1-3 ind notée dès le 23.10 (rV). Peu de mentions en dehors de ce pôle: isolés le 26.10 à Salgesch (Rey), le 8.11 à Raron (Sal), le 29.11 à Leuk (jmD, hDu), le 23.12 à Dorénaz (paP) et le 1.2 à Ardon (bM).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Deux migrateurs distincts le 14.9 sur les hauts de Liddes et Bourg-St-Pierre, 2400 et 2520 m (eRe; beP).

EPERVIER, SPERBER

Pics de passage à Bretolet: total de 66 ind les 21-22.9 (cSi) et 49 ind le 22.10 (P. Nietlisbach).

BALBUZARD, FISCHADLER

33 ind comptabilisés à Bretolet entre le 3.9 et le 17.10 (jHa et al.).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Entre autres, 4-6 individus présents du 23.11 au 1.3 entre Monthey et Vouvry (rV).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

3 migrateurs les 20 et 22.9 au col de Bretolet (jHa, jcT), un le 11.10 à Gampel (hDu). Un oiseau semble séjourner du 4.10 au 14.3 à Vionnaz-Vouvry (hDu, nJ, eS, rV).

FAUCON HOBÉREAU, BAUMFALKE

Presque exclusivement au col de Bretolet, où le passage est relevé entre le 3.9 et le 22.10 (div. obs.). Ailleurs, 4 migrateurs le 25.9 sur Trient, 2100 m (eMo), et 1 le 3.10 sur Bourg-St-Pierre, 2200 m (eMo).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

A Vouvry, s'en prend par deux fois à des vanneaux, le 19.10 et le 29.2 (nJ; yCr).

LAGOPÈDE, ALPENSCHNEEHUHN

Entre autres groupes familiaux, une réunion d'une quinzaine d'ind le 16.8 sur Nax, 2820 m (jeF). En hiver, une compagnie de 12 ind le 14.2 dans la région de Salanf, 1900 m (nJ).

TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN

Une plumée d'une poule trouvée le 4.1 dans un verger de Chamoson, 470 m (yCr).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Notamment 10 oiseaux le 20.9 sur Varen, 2450 m (aSi).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

En migration, max de 5 ind le 28.10 à Grône (mPe). Au cœur de l'hiver, uniquement vu à Martigny, entre le 25.12 et le 31.1 (2-3 ind; nJ, beP).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN

Une le 1.8 à Sierre (N. Quinodoz).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Un max de 12 oiseaux le 25.12 sur 2 km de canal à Martigny (beP).

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

7 le 27.8 sur Bürchen, 2800 m (E. Zbären) et 5 le 14.9 sur Bourg-St-Pierre, 2500 m (beP, N. Rielle).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

13 migrateurs le 25.6 à Vouvry (rV) et 9 le 27.6 à Illarsaz (eRe). Les mouvements sont ensuite perceptibles jusqu'au 27.11: parmi eux, nous soulignons sept mentions de 4-19 ind en provenance de Vouvry, 7 ind le 26.10 à Vétroz (bM), 45 puis 19 ind les 4 et 13.11 à Leuk (jmD, hDu, Rey) et un le 25.11 à Baltschieder (Ker). En décalage par rapport au flux automnal, un dernier le 25.12 à Martigny (beP).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un le 24.10 à Sierre (jSa).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE

A Martigny, une migratrice en fuite le 25.12 et une hivernante vue de façon continue du 25.1 au 15.3 (beP, nJ).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

En migration, nous relevons une première bien élevée le 29.7 au-dessus du lac de Moiry, 2540 m (jcT), et un max de 4 ind le 24.10 à Grône (jSa). Par la suite, 1-3 ind semblent hiverner à Vionnaz jusqu'au 6.2 en tout cas (nJ), et 2-3 ind sont vus à Monthey les 25.1 et 1.2 (rV).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Une le 28.10 à Vérossaz (paP).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

A Vouvry, un le 20.9 et 10 le 1.10 (rV), très belle troupe pour le canton.

COURLIS CENDRÉ, GROSSERBRACHVOGEL

Un le 25.10 à Collombey (beP, eRe).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Seulement 6 observations, dont 4 en altitude: le 19.6 sur les hauts de Collombey-Muraz, 1620 m (nJ), le 10.7 au Rawyl, 2380 m (K. Rösti) et les 5-6-8 en deux sites au-dessus d'Oberwald, 2150 et 2200 m (jcT).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Un ind en escale le 8.7 sur Zermatt, 2330 m (kEi).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Parmi le peu de mentions, un le 14.8 à Derborence (Rz) et 3 derniers le 3.9 à Oberwald (eMo).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

A Vouvry, belles troupes de 30 ind le 14.12 et de 46 ind le 15.1 (nJ; rV); au Bouveret, 11 le 29.12 puis 5 le 1.2 (nJ; beP, jmGa, jSa).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

7 le 24.8 entre Vionnaz et Illarsaz, puis 1 les 2 et 17.11 dans le même secteur (rV).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Suivi de rV dans la basse plaine: l'arrivée des estivants est bien marquée dès la mi-juin (72 ind le 15.6); en juillet-août, les effectifs dépassent à plusieurs reprises la centaine d'individus; ils se renforcent en septembre, et atteignent leurs valeurs maximales entre le 2.10 et le 4.12 (max absolu de 533 ind le 17.11). Après cette période de mouvement, la taille des groupes se réduit de façon notable, même si nous relevons une concentration hivernale de 112 oiseaux le 18.1. En migration, nous avons encore 2 ind le 25.9 sur Trient, 2100 m (eMo).

GUIFFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Une les 30-31.8 à Grône (Rey; hDu, beP).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Un le 29.9 à Martigny (beP), un le 11.10 à Bretolet (jcT),



2 le 19.10 à Vouvry (nJ) et 1-2 les 28.10 et 15.11 à Vionnaz (jCT; beP, hBe).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Un regroupement hâtif d'environ 300 ind le 8.7 à Vétroz (beP, eRe). Par la suite, présence marquée dans la basse plaine durant tout l'hiver, avec des pointes à 200 ind le 18.12 et le 14.1 à Collombey (rV).

TOURTERELLE TURQUE, TÜRKENTAUBE

Des regroupements de 17 ind le 18.9 à Zermatt (moJ) et d'au moins 100 ind les 24-28.11 à Monthey (rV).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Hors sites suspectés de nidification, une le 8.7 à Vétroz (beP), hâtive; une dernière bien tardive le 19.10 à Vouvry (nJ).

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Dortoir de 4-5 ind trouvé en janvier en plaine de Leuk (M. Fontannaz).

CHOUETTE DE TENGMA, RAUHFUSSKAUZ

En mouvement cette année: capturée 16 fois à Bretolet.

MARTINET PÂLE, FAHLSEGLER

Au moins un oiseau le 29.7 sur Fiesch (J. Bisschop et al.; CAVS).

MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL

Hors sites de nidification, un le 10.7 à Riddes (sEh), peut-être déjà en dispersion; suivent 2 le 1.8 à Vouvry (rV). Vu régulièrement jusqu'à fin novembre, puis huit mentions en décembre-janvier, à Port-Valais, Vionnaz, Collombey, Martigny et Conthey.

HUPPE, WIEDEHOPF

Une aux Giettes le 31.8 (M. Gasser).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Le 10.9 sur Töbel, 2040 m (E. Gunzinger) et le 25.9 à Zeneggen (Zur).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Quelques ind hivernent à Savièse (bM). En migration, nous relevons quatre mentions de la basse plaine, dont un max de 35 ind le 25.10 à Collombey (beP, eRe), 5 oiseaux le 24.10 à Evolène (J.-P. Gaillard), 2 le 1.11 à Sion (bM) et 7 le 5.11 à Dorénav (hDu).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE

Après un passage bien remarqué dans la basse plaine (notamment 500 ind le 23.10 à Vouvry; rV) plusieurs dizaines d'ind hivernent dans la région, où les effectifs s'élèvent brusquement à 800 ind le 22.1 (rV), masse d'oiseaux en probable fuite hivernale. Presque inaperçue ailleurs, excepté 2 ind le 5.12 à Turtmann (hDu) et 13 ind le 25.12 à Martigny (beP).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFERSCHWALBE

Réapparaît dès le 6.7 à Grône (Sal), puis notons une le 19.8 à Zeuzier (beP) et 3 dernières le 11.10 à Bretolet (jCT).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Encore une quinzaine le 1.11 à Fully (beP) et 5 le 2.11 à Evionnaz (nJ).

PIPIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Un le 14.9 sur Bourg-St-Pierre, 2530 m (beP).

PIPIPIT FARLOUSE, WISENPIEPER

Notons un le 31.1 à Martigny (beP), seule mention hivernale.

PIPIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

Dans le secteur de plaine Collombey-Vouvry, rV en compte environ 500 les 19 et 23.10, puis 200 les 17.11 et 18.12 et 80 les 28-30.12; en janvier-février, les effectifs ne dépassent plus la barre des 50 ind.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Notons une première migratrice le 19.8 à Zeuzier, 2200 m, et encore un min de 30 ind le 29.9 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Bon hivernage rapporté à l'aval du coude du Rhône, principalement dans la basse plaine, avec un max important de 40 ind le 4.1 à Vouvry (rV). En marge, 1-2 ind les 26.12 et 7.1 à Val-d'Illiez (rV).

CINCLE, WASSERAMSEL

Entre autres, un juv en dispersion le 3.8 au-dessus de Grimetz, 2800 m (aBa), 4 ind le 28.12 sur 400 m d'un canal de Vionnaz (nJ) et au moins 8 le 29.12 entre Evolène et les Haudères (mTh).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

Déjà en plaine le 11.7 à Grône (jeF), et fort passage le 22.9 à Bretolet (une centaine d'ind; P. Rapin). Particulièrement discret en hiver (vu seulement en 5 sites), et même absent en janvier.

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Seulement trois mentions inférieures à 1000 m: 2 le 6.12 à Leuk, 850 m (Rey), 2 le 24.12 à Martigny-Combe, 740 m (eRe), et 2 le 29.2 à Chamoson, 550 m (S. Bachmann).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Une le 16.9 à Leuk (Rey) et une le 20.9 à Vouvry (M.-Cl. Reihle).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Sept mentions du 1.12 au 15.2 en 5 sites du Valais central, dont une bien élevée le 6.12 au-dessus de Conthey, 1920 m (jCT).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Observations tardives à début novembre: encore 2 le 2.11 à Baltschieder (Ker) et un dernier le 5.11 à Leuk (eRe).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Notons 16 migrateurs concentrés le 19.10 à Martigny (beP). Durant l'hiver, 4 le 5.12 à Turtmann-Gampel (jmD, hDu), et des isolés les 7.12 et 6.1 à Vouvry (rV; nJ), le 31.12 à Sion (nJ), les 10.1 et 8.2 à Dorénav (nJ) et le 15.2 à Turtmann (Sal).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Encore 3 ind le 15.10 sur Greich et Fiesch, 2300 m (Ch. Dvorak).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Pour la première fois, mentions hivernales sur le site de reproduction de Chamoson: une f le 18.1 (rA) et un m les 11-12 et 21.2 (rA, H. & R. Henzelin, liM, beP).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Isolées le 2.11 à Ardon (beP), le 31.1 aux Rigoles de Vionnaz (nJ), le 17.2 à Grône (M. Wettstein) et présente en février à Savièse (bM).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDLSCHWIRL

Une le 4.9 sur Birgisch, 2050 m (O. Appert).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHRORHSÄNGER

Une attardée le 1.11 à Martigny (beP).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Notons 2 attardées le 28.10 à Zermatt (P. Tröndle). En hiver, vue en 5 sites, dont Sierre où 1-3 ind séjournent du 30.12 au 25.1 (Rey).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

3 le 13.12 à Sierre (Rey), 1 le 5.1 à Martigny, 1 les 6-19.1 à Vionnaz (eS).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

Au moins 5 le 2.10 à Grône (hDu) et vue ou entendue les 6-19.10 et 1.11 à Martigny (beP).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Des migratrices vues à Vouvry le 2.10, à Vionnaz le 4.10 (nJ), à Raron le 8.11 (Sal) et à Agarn du 29.11 au 5.12 (jmD, hDu), et une hivernante vue du 23.11 au 7.3 à Vouvry (nJ, jeF, rV).

CHOCARD, ALPENOHLE

Dès le 7.10 à St-Maurice, le 8.10 à Martigny, le 18.10 à Chamoson (beP). 500-600 ind présents durant l'hiver et en avril dans la station d'Ovronnaz, phénomène nouveau, car la grande majorité des chocards des Muverans gagnait la plaine auparavant (P.-A. Ravussin, eS).

GRAVE, ALPENKRÄHE

Entre le 29.11 et le 11.4, signalé au-dessous de 1000 m à Leuk-Turtmann et entre Chamoson et Conthey (div. obs.).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Un le 29.11 à Gampel (hDu) et 8 le 30.1 à Vouvry (rV).



CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Relevons une le 22.11 à Bourg-St-Pierre, 1600 m (sMe).

ÉTOURNEAU, STAR

Premières bandes de juv le 19.6 à Collombey (eRe). Encore 180 ind le 2.11 à Turtmann (Sal), puis vu par troupes de 5-50 ind jusqu'au 18.12 en plusieurs localités.

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

Un ind en quête de nourriture le 27.1 sur la terrasse d'un restaurant d'altitude de Zermatt, 2940 m (H.-P. Suter), record d'altitude pour l'espèce en Suisse.

NIVEROLLE, SCHNEESPERLING

Rassemblement familial d'environ 120 ind le 1.8 sur Conthey (rA) et d'au moins 100 ind le 5.8 sur Emosson (Val); suivent en hiver une centaine les 23-26.2 à Betten (L. Jenni) et environ 90 le 5.3 à la Fouly, 1600 m (M. Rogg). Trois mentions de faible altitude: 10 le 18.1 à Vérossaz, 1000 m (paP), 4 le 3.1 sur Conthey, 1030 m (nJ, bM) et 4 le 30.1 à Vionnaz, 390 m (rV).

PINSON DES ARBRES, BUCHFINK

Regroupements importants: au moins 800-1000 ind entre le 7 et le 23.10 à Vouvry puis 250 les 25-30.1 et 300 le 26.2 dans un secteur voisin (rV); 200 le 29.1 à Miège (A. Brahier).

PINSON DU NORD, BERGFINK

9 le 17.10 à l'Arpille/Martigny, 1770 m (beP), puis signalé en janvier-février dans le Chablais, avec un max de 35-40 ind les 26-27.2 à Monthey (rV); 10 derniers le 6.3 à Conthey (beP).

SERIN, GIRLITZ

Totalement inaperçu entre le 13.11 et le 8.2.

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

En hiver, surtout signalé sur les hauts d'Ardon-Conthey, avec un max de 32 ind le 4.2 sur les mayens de Conthey, 1600 m (Y. Schaerer). Hors Valais central, 3 le 25.12 à Albinen (aSi) et 5 le 1.2 sur le bas coteau de Fully (eRe).

CHARDONNET, DISTELFINK

Présence hivernale rapportée entre Monthey et Lalden. Entre autres mentions, nous retenons 150 ind le 29.1 à Miège (A. Brahier), groupe très important, une vingtaine le 26.12 à Vernayaz (nJ), 24 le 6.1 à Ardon (jCT), et une vingtaine les 2 et 14.2 sur Conthey (liM, cSi). Sept observations supérieures à 1000 m, dont celles de 30 ind le 8.1 à Bürchen, 1500 m (Zur), et de 10 ind le 27.12 sur Erschmatt, 1900 m (mBn).

TARIN, ERENZEISIG

Bonne fréquence hivernale relevée dans le Chablais (eS) avec un max d'une centaine d'ind le 3.2 à Monthey (rV); relevons aussi une troupe d'une dizaine d'ind franchissant le col de Ecandies/Trient, 2800 m (eRe), le 12.1.

LINOTTE, HÄNFLING

Une centaine le 18.10 à Ardon, où l'on en retrouve 26 le 6.1 (jCT). En hiver, soulignons également 15 ind le 7.1 à Saillon (jCT), 50 le 29.1 à Miège (A. Brahier) et 13 le 13.2 sur Conthey (mGe).

GROSBEK, KERNBEISSER

Une trentaine le 1.2 au Bouveret (beP, jmGa, jS) et une quinzaine le 23.2 sur Conthey (cSi). Vu principalement le long du sillon rhodanien. Quelques mentions dans les vallées latérales: 1-2 les 11-12.10 à Troistorrens (A. Brahier), 1 le 29.11 à Vissoie (eBe) et 1-2 les 28-29.2 à Bovernier (bV).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Entre le coude du Rhône et Lalden, trente-sept mentions hivernales de 1-20 ind chacune, dont 2 au-dessus de 1000 m: 2-3 ind les 18 et 26.2 à St-Luc (S. Antoniazza, eBe).

BRUANT NAIN, ZWERGAMMER

Un ind séjourne du 2.2 au 12.3 dans un verger de Premploz, sous réserve d'homologation par la CAVS.

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Au moins 40 le 22.10 à Muraz (beP). Présent durant l'hiver à Vionnaz (eS, rV) et Martigny, où beP signale un max important de 25 ind le 31.1.

MIGRATION DE PRINTEMPS ET NIDIFICATION EN 2004

Emblème de la saison de nidification, la **FAUVETTE PAS-SERINETTE**, en invasion cette année, s'est reproduite avec succès pour la deuxième fois dans notre pays, sur le même site qu'en 1996. Brièvement, elle fut même côtoyée par une **FAUVETTE PITCHOU**, association conférant au site des Follatères un air définitivement méditerranéen! Dans un contexte plus familial, les oiseaux des milieux cultivés connurent des fortunes pour le moins diverses. Alors que la population de **HUPPE**, sur la lancée de 2003, battit de nouveaux records de reproduction, d'autres espèces se retrouvent en situation critique; c'est notamment le cas du **BRUANT ORTOLAN**, dont les effectifs se sont effondrés au cours de la dernière décennie, ou du **VANNEAU HUPPÉ**, dont le statut de nicheur valaisan est peut-être définitivement révolu. Entre ces deux situations extrêmes, des espoirs de maintien, voire de progression, sont permis pour la **FAUVETTE GRISETTE** ou l'**ALOUETTE LULU**, qui semblent se réinstaller localement en des milieux mieux adaptés à leurs exigences. La saison de migration a réservé son lot de surprises, au rang desquelles nous trouvons le bref séjour d'une **ALOUETTE CALANDRE**, ainsi qu'une «tombée» de limicoles dans le contexte météorologique tourmenté de début mai: les escales valaisannes de **BÉCASSEAUX MAUBÈCHES**, de **BÉCASSEAUX SANDERLING**, de **BARGES ROUSSES** ou de **CHEVALIERS GAMBETTES** s'inscrivirent dans les mouvements aux allures d'invasions rapportés à l'échelon national.

FRUHJAHRZUG UND BRUTPERIODE 2004

Das Flugschiff dieser Brutsaison war die **WEISSBART-GRASMÜCKE**, die nach einer Invasion zum zweiten Mal erfolgreich in unserem Land gebrütet hat, dies am selben Ort wie 1996. Für kurze Zeit hatte sie Gesellschaft von einer **PROVENCEGRASMÜCKE**, womit über den Follatères endgültig ein mediterraner Hauch schwebte! Den üblichen Gästen des Kulturlandes war ein sehr unterschiedlicher Erfolg beschieden. Während der **WIEDEHOPF** nach seinem Exploit vom Vorjahr erneut für Rekordwerte sorgte, befanden sich andere Arten in einem kritischen Zustand. Dies ist namentlich beim **ORTOLAN** der Fall, dessen Bestände sich über die letzten zehn Jahre stark ausdünnten und beim **KIEBITZ**, der möglicherweise dem Wallis als Brutvogel für immer den Rücken gekehrt hat. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine gewisse Hoffnung, dass sich Arten wie die **HEIDELERCHE** oder die **DORNGRASMÜCKE** halten oder sogar wieder punktuell an geeigneten Stellen ansiedeln können. Die Zugsaison hielt wieder einige Überraschungen bereit, darunter fallen der kurze Aufenthalt einer **KALANDERLERCHE** sowie eine Woge von Limikolen, die bei den meteorologischen Turbulenzen von Anfang Mai "angespült" wurden: Die Rast von **KNUTTS**, **SANDERLINGEN**, **PFUHLSCHNEPFEN** und **ROTSCHENKELN** bei uns widerspiegelt das geradezu invasionsartige Auftreten, das landesweit beobachtet wurde.



GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

De retour le 1.3 à Martigny (beP). Deux sites d'altitude avec reproduction certaine, sur Muraz, 1600 et 1670 m (jCT).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Les sites de présence hivernale sont définitivement désertés à partir des 8-9.4 à Monthey et Granges (rV; jSa).

CORMORAN, KORMORAN

Des retardataires encore observés le 8.5: 4 à Grône (mPe) et 1 à Leuk (cSi).

BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

Nidification possible à Grône (div. obs.), un le 24.6 à Montorge (Rey) et, situation inédite et réjouissante, 2-3 terroirs possibles aux étangs de Leuk (J. Bruezière, beP et al.).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Total printanier de vingt-six mentions. Premier le 3.4 à Martigny (beP), max de 8 le 6.5 à Leuk (cSi) et dernier le 5.6 sur le même site (eWe); également vu à Conthey, Grône et Finges.

CRABIER, RALLENREIHER

Les 9-11.5 à Leuk (cSi; hDu, aGe, liM) et du 2 au 4.6 à Martigny (beP, eRe).

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

A Leuk, un le 17.4 et 2 le 27.4 (jmD, hDu; eMo).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Vingt-deux mentions entre le 6.4 et le 19.6, avec des max remarquables de 12 ind le 27.5 à Saillon (Sch) et de 9 ind le 31.5 à Martigny (beP).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Une le 3.4 à Massongex (beP), max de 3 ind à Grône les 10-11.4 (jSa; mPe, mTh), et dernières le 7.5 à Gampel et les 7-8.5 à Leuk (cSi).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Un erratique le 3.5 à Geschinen, 1350 m (eG).

HÉRON POURPRÉ, PURPUREIHER

Total de trente mentions de 1-4 ind réparties entre le 17.4 à Leuk (jmD) et le 30.5 à Leuk et Sierre (cSi; pMo), et un retardataire le 18.6 à Leuk (jCT). Dans le Haut-Valais, nous retenons 2 oiseaux le 1.5 à Gampel (cSi) et 1 le 4.5 à Visp (U. Luggen), en dehors des sites d'escalade traditionnels. Estivage possible à Finges (J. Vielle, paO).

GIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

2 le 26.4 à Muraz (gCa), 2 du 4 au 9.5 à Vionnaz-Vouvry (nJ, rV), une le 21.6 à Collonges (F. Steiner) et une du 11 au 29.6 à Leuk-Turtmann (div. obs.).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Des fam le 13.5 à Illarsaz et le 18.5 à Monthey (rV).

OIE CENDRÉE, GRAUGANS

Une le 11.3 à Collombey (rV).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Un le 7.3 à Granges (jSa).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône essentiellement, où les effectifs de mars atteignent 20-40 ind, puis fondent dès les premiers jours d'avril: 6 dernières le 10.4 (jSa).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

15-20 c le 20.5 sur le lac de Champex, 1470 m (eRe), colonisation nouvelle par son ampleur.

CANARD PILET, SPIESSENTE

Un le 1.3 à Monthey (rV).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

7 premières le 25.3 à Illarsaz (rV) puis 6 le lendemain à Martigny (beP). Par la suite, nous retiendrons quatre mentions en provenance de Grône, ainsi que 4 ind le 3.4 à Sion (yCr) et une dernière le 6.5 à Leuk (cSi).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTÉ

Un le 20.3 à Saxon (hDu), un du 9 au 12.4 à Martigny (beP) et une troupe de 13 ind le 18.4 à Granges (jSa).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

3 le 11.3 à Monthey (rV).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Un effectif printanier variant entre 3 et 16 ind signalé à Illarsaz entre le 15.2 et le 28.3 (rV); un le 6.3 à Conthey (beP).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

A Grône, jSa recense 14 c le 5.7, et 9 fam sont signalées en juillet-août (Rey). Ailleurs, retenons des c le 18.5 à Finges (Rey) et le 20.5 à Champex (eRe), ainsi qu'une fam le 17.8 sur le canal Stockalper à Port-Valais (jCT).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

1 c le 1.5 à Massongex et une reproduction certaine au Bouveret (jCT).

BONDRÉE, WESPENBUSSARD

Suite à un probable décalage de la voie de passage habituelle pour des raisons météorologiques, migration exceptionnelle constatée dans la région du coude du Rhône, avec au moins 75 ind le 8.5 sur Evionnaz (nJ) et 165 ind le 9.5 sur Fully (S. Denis).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Un oiseau chassant durant deux heures le 10.6 sur le lac de Salanfe, puis regagnant la plaine; vu aux abords du même lac le 25.7 (nJ).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

2 premiers le 4.4 à Fully (mPe), max de 4 ind le 9.4 à Martigny (nJ), puis relevons un oiseau le 12.4 sur Conthey, 2070 m (jCT) et un dernier le 26.5 à Leuk (M. Thoma).

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIHER

Au moins 5 oiseaux différents signalés entre le 1.3 et le 27.4 à Leukerbad (D. Roten et al.), dont Veronika (subad) et un ind ad. Un Gypaète est encore vu le 12.5 sur Albinen (paO), puis la région est désertée, hormis une mention isolée le 9.6 (A. Lange); toujours dans le Haut-Valais, un imm vu le 16.5 dans le Fieschertal (Chr. Agten), et un autre (Thurri, lâché en 2003) visite le Binntal le 22.4 (L. Greppi), entre deux passages sur les hauts de Conthey (20 et 26.4; jCT; F. Udry). Transalpaete (2003) est présent sur la rive gauche: le 14.5 sur Riddes-Verbier (paO), le 17.5 à Louvie (H. Dumoulin, paO) et le 10.6 à Evolène (W. Maury). A Derborence, le c occupe toujours les lieux.

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Entre le 4.4 à Grône (mPe) et le 14.5 à Rotafen (U. Kägi).

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Seulement quatre mentions: le 5.4 à Fully (P.-A. Ravussin), le 9.6 à Leukerbad (K. Rösti), le 21.7 à Savièse (bM) et le 25.7 sur Evionnaz, 2140 m (nJ).

BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE

Peu de mentions printanières. Jusqu'au 18.4 à Collombey-Vouvry (rV); ailleurs, isolés le 19.3 à St-Gingolph (eS) et les 12 et 14.3 à Agarn et Turtmann (mBn; Rey).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Le 17.4 à Martigny (bV), le 23.4 et le 13.5 à Illarsaz (beP, eRe), le 24.4 à Chamoson (beP) et le 14.5 à Ardon (rA).

AIGLE ROYAL, STEINADLER

Vu à trois reprises survolant la plaine: le 27.3 à Martigny, 520 m (eRe), le 10.4 à Leuk, 620 m (cSi) et le 5.6 à Varen, 570 m (dKl).

BALBUZARD, FISCHADLER

Le 24.3 à Grône et les 8-9.5 à Leuk (Rey; cSi).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

La tendance en plaine est positive: 7 nichoirs occupés (dont 5 dans le Chablais, 1 à Collonges et 1 à Sierre) et 2 autres c installés sur des bâtiments industriels, à Collombey et Charrat (eRe SOS VS).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Un m le 30.4 à Chalais (beP, eRe), puis au moins 5 ind chassant les hannetons le 2.5 à Bramos, localité où un dernier ind est signalé le 27.5 (rA). Encore ailleurs, isolés le 6.5 à Gampel (cSi), le 18.5 à Vouvry (nJ) et le 21.5 à Leuk (jmD).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Hors secteur Vionnaz-Vouvry, où nous relevons un ind tardif le 5.5 (hDu), un le 19.3 à St-Gingolph (eS).



FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Premiers le 12.4 à Charrat (jcT) et le 17.4 à Vionnaz (nJ), puis retenons, parmi le peu de mentions, celle d'un ind le 25.5 à Zermatt, 1700 m (jcT). Comme l'an dernier, aucune preuve de nidification; les oiseaux présents le 20.7 à Leuk (Rey) et les 26.7 et 4.8 à Collombey (jcT; eS) sont-ils des migrateurs hâtifs ou des nicheurs potentiels?

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Présence rapportée entre Vouvy et Filet, uniquement le long du sillon rhodanien.

GÉLINOTTE, HASELHUHN

Deux mentions relativement élevées: le 20.5 sur Dorénaz, 2000 m (aBa) et le 21.5 sur Visp, 2100 m (U. Luggen).

TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN

Au moins 34 ind le 29.5 sur 3 km² au-dessus de St-Niklaus, 2100-2250 m (jcT).

CAILLE, WACHTEL

Bonne année. Entendue essentiellement dans la plaine haut-valaisanne entre Leuk et Gampel (plusieurs ch). Ailleurs, 1 ch du 16 au 27.7 à Vouvy, 1 ch du 24.5 au 11.7 à Vionnaz (M.-Cl. Reihle), 2 ch le 4.6 à Dorénaz (eRe), 2 ch à Finges les 9 et 30.6 (aGe), 1 ch le 7.7 à Erschmatt (eRe), 1 ch le 3.7 à Bürchen (Zur) et 2-3 ch du 16 au 26.7 à Geschinen et Obergesteln (aGe).

RÂLE D'EAU, WASSERLALTE

Par rapport aux sites de l'année précédente, rajoutons 1 ch le 24.4 à Sierre (beP), 1 le 26.5 à Montorge (cMo) et 1 les 29.5 et 5.6 à Leuk (cSi; St. Stutz, W. Zanola).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

Entre autres, 5 c le 26.5 à Montorge (cMo) et au moins 7 fam pour un total d'environ 40 ind le 11.7 à Grône (jcT).

PETIT GRAVELOTT, FLUSSREGENPFEIFER

Hors Finges, migrateurs isolés les 4-5.4 à Grône (mPe), le 8.4 à Sierre (jSa), le 10.5 à Martigny, et les 11-22.5 et 6.6 à Leuk (aGe; jSa; dKl, eWe). Couve en mai à Conthey (beP).

PLUVIER DORÉ, GOLDREGENPFEIFER

Un le 10.3 à Collombey, en vol (beP, eRe).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

25 le 13.2 à Vétroz (beP), 10 le même jour à Baltschieder (mGe). Les Vanneaux déferlent ensuite sur le canton durant la première moitié de mars: le 7.3, ils sont 500 à Vouvy (M.-Cl. Reihle), 28 à Sion (E. Bertouille), 27 à Raron (Sal), et 2 à Reckingen, 1600 m (mEg); le 8.3, ils sont au moins 189 à Martigny (beP, N. Rielle); les 10-11.3, ils sont 71 puis 101 à Vétroz (yCr; bM); le 14.3, ils sont 130 à Vionnaz (rV); le 15.3, ils sont 31 à Aproz et 9 à Sierre (bM; jmGa). Après cette date, le passage s'estompe brusquement, et prend fin le 19.4 à Martigny (beP). Aucune tentative de nidification relevée dans le dernier bastion traditionnel de Vouvy, où l'espèce n'est plus observée après le 28.3 (rV).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE, KNUTT

Le 9.5, un à Martigny et un à Leuk (beP, eRe, V. Revaz; cSi): 2^e et 3^e données valaisannes.

BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING

2 le 9.5 à Leuk (cSi).

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

4 le 19.3 à Leuk (S. Keller) et 1-2 les 14-15.4 à Grône (mPe, Rey).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Quatorze mentions étalées entre le 26.2 et le 30.4, à Martigny, Grône, Sierre et Leuk.

BARGE ROUSSE, PFUHLSCHEPPE

En escale les 6-9.5 à Leuk (2 ind différents; cSi) et du 9 au 11.5 à Martigny (beP, Chr. & V. Keim, eRe, V. Revaz), premières mentions pour la plaine valaisanne en dehors du Chablais.

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHEKEL

L'espèce est vue à Leuk entre le 6 et le 14.5, avec une concentration exceptionnelle de 41 ind le 9.5 (cSi). Ailleurs, 3-5 ind du 7 au 9.5 à Martigny-Fully (beP) et 3 le 9.5 à Grône (jSa).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un le 18.6 à Leuk (jcT).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Abondance de données de 1-3 ind réparties entre le 13.3 et le 2.5, majoritairement à Grône et Sierre.

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Vu uniquement à Grône et Leuk entre le 15.4 et le 9.5 (div. obs.), avec un max de 4-5 ind les 29.4 et 1.5 dans le premier site (Rey; mPe).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Des fam le 5.6 à Finges (dKl, eWe) et le 12.7 à Geschinen (aGe); à noter également 2 ind les 12 et 15.7 à Oberwald, 1770 m (aGe), site possible de reproduction.

MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÖWE

Une le 6.5 à Conthey (bM).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

A noter le 20.3: 12 à Saillon (hDu) et au moins 70 à Massongex (rV).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

Un le 22.5 à Vouvy (nJ).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

2 le 4.4 à Sierre (jSa), 1 le 9.4 à Collonges, 1 le 24.4 à Grône (beP, jSa), 6 le 18.6 à Leuk (jcT) et 2 le 21.6 à Martigny (beP); le 21.6 également, un oiseau franchit le Pas de Cheville sur Derborence, 2000 m (S. Aubry).

STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE

Une le 16.4 à Conthey (bM).

GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE

Une le 21.5 à Grône (eBe, jSa).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Egalement à Grône, le 30.4 (Rey).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Seulement en migration: 42 le 8.4 à Monthey (rV), un le 9.4 à Collonges (beP) et un dernier le 15.5 à Fully (beP), hors dates habituelles de passage.

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Indices de reproduction: ch entendus le 30.5 à Leuk (cSi), le 5.6 à Finges (dKl, eWe) et le 19.6 à Martigny (beP); ind vus le 6.6 à Evionnaz (nJ) et le 22.6 à Sierre (jSa).

COUCOU, KUCKUCK

Avant-coureur le 11.4 à Leuk (cSi), puis régulier à partir du 20.4. Concernant la reproduction en plaine, statu quo par rapport à l'an dernier.

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Aucun indice de reproduction en dehors de la basse plaine, où 3 nichoirs sont occupés. Dans une grange de Vionnaz, échec pour une deuxième nichée tardive (3 juv bagués le 8.10 puis trouvés morts le 18.10) (eRe, beP SOS VS). A noter qu'une f née en juin 2003 à Vionnaz a été retrouvée nicheuse le 12.5 et le 27.7 vers Cudrefin VD, à 73 km de son lieu de naissance (A. Roulin).

PETIT-DUC, ZWERGÖHREULE

Quatre sites occupés dans le noyau central d'Arbaz-Ayent-Grimisuat, dont deux avec reproduction certaine. De plus, un ch probablement migrateur le 21.4 à Ayent (autre site), un ch les 13-17.6 à Savièse (aSi et al. SOS VS), un ch le 27.5 à Grône (hDu), un c installé à Finges (aGe) et un m solitaire du 29.4 à fin mai à Unterstalden (aAe, rA, U. Zimmermann).

GRAND-DUC, UHU

Reproduction certaine en 4 sites de plaine et un ch en altitude (aAe, rA Uni BE et al.).

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Des cris de juv le 21.8 sur Montana, 1950 m (aSi).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

Un migrateur probable le 11.5 à Fully (beP). Des recensements permettent de localiser 4 m cantonnés au Bois de Finges et 8 sur le coteau de Salquenen (contre 14 en 1998 sur le même secteur) (aGe, aSi SOS VS). Egalement entendu sur le coteau de Leuk (div. obs.), ainsi que le 1.7 à Visperterminen (aGe).

MARTINET NOIR, MAUSERSEGLER

Arrivée hâtive: premier le 2.4 à Grône (mPe), puis régulier dès le 7.4.

MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL


En migration, notons un oiseau le 3.3 à Lalden (gWy). Plus tard, des ad transportant de la nourriture les 21.5 et 5.7 à Grône (eBe; jSa), le 30.5 à Conthey (Rey) et le 3.6 à Sion (nJ); en outre, une reproduction certaine aux Rigoles de Vionnaz (eS), et au moins un ind signalé en juin à Finges (Rey, jCT).

GUÉPIER, BIENEFRESSER

Un le 1.5 à Vouvy (liM), 7-14 le 11.5 à Rotafen et Leuk (hDu, liM), où l'on en retrouve 5 le 14.5 (beP, eRe), 9 le 13.5 à Martigny (J. Curchod), 2 le 16.5 à Termen (R. Arnold) et un dernier le 27.5 à Lax (U. Glutz von Blotzheim).

HUPPE, WIEDEHOPF

Une première bien hâtive le 14.3 à Lalden (gWy), puis régulière à partir du 24.3; également en migration, des escales le 15.4 dans le val Ferret, 1380 m (S. Tissières), et le 18.4 à Derborence, 1600 m (B. & C. Gabbud). La population de plaine poursuit sa progression remarquable: 113 nichées entre Martigny et Sierre permettent l'envol de 531 juv! A Fully, l'espèce semble reconquérir le coteau (5 sites avec indices de présence). Également sur l'adret, ch isolés signalés à Ayent (J.-J. Crettaz par nJ), Grimisuat (B. Roduit) et Savièse (P.-A. Varone), et un c paradant le 4.5 à Montana (G. Rey par aSi). En rive gauche, un c avec m ch le 7.6 à Mase (beP), site inconnu jusqu'ici. Dans le Haut-Valais, reproductions certaines en trois localités, et des ch isolés entendus en 6 autres sites.



Progression de la HUPPE en plaine valaisanne (Martigny, Sierre) depuis l'installation de nichoirs. En grisé: le nombre de nichées; en noir: le nombre de jeunes envolés.

TORCOL, WENDEHALS

64 nichoirs de plaine occupés entre Vernayaz et Sierre, pour 71 nichées et 266 juv à l'envol (S. Geiser, Sch, aSi Uni BE & SOS VS), succès inférieur à celui de 2003. Bilan pour les vallées latérales: ch signalés en deux points du val d'Entremont (eRe), en dix sites du val d'Hérens (beP) et en cinq points du Goms (aGe).

PIC ÉPEICHETTE, KLEINSEPECHT

Une vingtaine de mentions réparties le long de la vallée du Rhône, et un ch le 10.6 à St-Martin, 1280 m (beP), seule présence constatée dans une vallée latérale.

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSEPECHT

Le 25.4 à Zeneggen, 1620 m (B. Bäumlér), le 23.5 au-dessus de Vionnaz, 1660 m (jCT) et le 18.8 sur Chemin/Martigny (Chr. & V. Keim), site inédit.

ALOUETTE CALANDRE, KALANDERLERCHE

Un m ch les 9 et 11.4 à Martigny (beP, eRe, gCa; CAvS).

ALOUETTE CALANDRELLÉ, KURZZEHELERCHE

Isolées le 24.4 à Turtmann (hDu), les 2-6.5 à Leuk (hDu, cSi) et le 5.5 à Vouvy (hDu).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHÉ

Chante le 5.4 à Fully (P.-A. Ravussin) et durant le même mois à Saillon (jCP), mais sans suite. Par contre, 2-3 ch entre avril et juin à Leytron (jCP), de même que plusieurs ch dans les vignes de Chamoson, Conthey, Sion, Savièse, Ayent, St-Léonard et Lens (pMo & Sch Uni BE, bM, beP, eRe, aSi), laissent espérer une tendance à la recolonisation d'anciens bastions du Valais central. Les sites traditionnels ne sont pas en reste: une dizaine de territoires les 25 et 28.6 dans les vignes de Salgesch-Varen (eRe).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFRSCHWALBE

Première le 26.3 à Grône (Rey), puis retenons 2 ind le 4.6 à Oberwald (aGe), ultime mention printanière.

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

Arrivée le 11.2 à Raron (Sal). Par la suite, nous retenons des nids signalés sur l'école de Zermatt (jSa), l'église de Vissoie (mPe), des fermes de Grimontz (beP) et d'Isérables (J.-F. Burri), le château de St-Maurice (Rz), et des maisons d'habitation de Bruson, Lalden et Ergisch (M. Veuthey; aGe; gWy).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Deux premières le 14.3 à Grône (mPe).

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSchwalbe

Retour déjà noté le 20.3 à Sierre (jSa).

PIPIT ROUSSELINÉ, BRACHPIEPER

2 premiers le 18.4 à Conthey (pMo), puis majoritairement vu entre Leuk et Raron, où nous relevons un groupe remarquable de 26 oiseaux le 5.5 (cSi). Plus en aval, 2 le 21.4 à Sierre (jSa), 3 le 1.5 à Vouvy (hDu, liM) et 2 le 2.5 à Martigny (beP). Absent après le 8.5.

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Belle densité de ving et un territoires sur 1 km² au-dessus des Haudères (mTh).

PIPIT FARLOUSE, WISENPIEPER

Pour la première fois, un indice de reproduction rapporté hors région de Goms: un ch le 23.7 au Simplon, 2030 m (M. Blattner).

PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

1-3 ind vus à Leuk entre le 1.5 et le 11.5 (liM, cSi), 1-2 ind à Gampel entre le 1.5 et le 6.5 et 1 ind le 2.5 à Martigny (cSi).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

Les chutes de neige de début mai contraignent les oiseaux à se réfugier temporairement en plaine: au moins 120-160 les 5-6.5 entre Leuk et Raron (cSi), 80 le 8.5 à Collonges-Doréaz et une quinzaine le 9.5 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Première très hâtive le 10.3 à Grône (jSa), puis régulière dès le 30.3; déjà une centaine d'ind le 9.4 entre Collonges et Martigny (beP), et dernière migratrice le 31.5 à Martigny (beP). Pas de chiffres précis pour la population nicheuse du Chablais, mais des nouvelles de celle du Haut-Valais: douze territoires comptés le 11.6 à Leuk-Agarn-Turtmann et trois territoires le 1.7 à Gampel (beP SOS VS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Retour le 19.2 en ville de Sion, avec un dortoir de 40 ind établi sur un platane (M. Wettstein).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Un ch bien hâtif le 8.4 à Martigny (beP), mais les données ne deviennent régulières qu'à partir du 16.4. 24 ch le 5.5 à Leuk (cSi), en pleine période de migration; on en retrouve 19 le 26.5 dans le même secteur (M. Thoma) et encore 15 le 5.6 (St. Stutz, W. Zanola). 1 ch le 27.5 à Ritzingen, 1290 m (aGe), migrateur attardé en plein cœur du Goms, seule mention hors plaine ou coteau.

GORGBLEUÉ, BLAUKEHLCHEN

Une le 4.4 à Lalden (gWy).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

1 ch le 4.6 à Sion (colline de Valère; beP), seul ch cantonné de plaine en aval de Salgesch. Les villages du Haut-Valais sont bien occupés: 10 ch entendus le 18.5 dans la zone Albinen-Guttet-hauts de Leuk (aGe), 5 le 15.5 à Lalden (gWy), 4 le 19.5 sur Törbel, 1740-2080 m (jct), 4 le 21.5 à Zeneggen (aGe), 6 le 6.6 à Zermatt (jct).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Derniers migrateurs le 31.5 à Martigny (beP). 1 ch dans l'enceinte de la raffinerie de Collombey, seul cantonnement de plaine hors population de Leuk-Turtmann, qui compte vingt territoires pour 2.37 km² (beP, eRe SOS VS). Les densités remarquables de certaines régions du Goms sont confirmées: quarante-six territoires pour une surface de 80.2 ha entre Münster et Geschinen, où l'on dénombre par ailleurs un max de 115 juv le 26.7 (aGe SOS VS). Ailleurs en altitude, notons 8 c le 29.7 dans le vallon d'Emaney/Salvan (jct).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Un le 16.3 à Bourg-St-Pierre, 1620 m (sMe), très probablement en escale migratoire, puis notons 1 ch très élevé le 20.5 à Vernamiège, 1500 m (mTh). Les différents recensements de plaine donnent vingt-cinq territoires entre le Léman et Collombey (eRe), vingt entre Evionnaz et Charrat (beP, eRe, nJ) et vingt sur 2.37 km² de la plaine de Leuk-Turtmann (beP, eRe SOS VS).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Premier le 5.4 à Collombey, et un dernier migrateur tardif le 25.5 à Evionnaz (eRe). Belle densité relevée les 27-29.6 au-dessus de Täsch-Zermatt, 2300-2600 m, avec un total de soixante-neuf territoires pour une surface discontinue d'environ 4 km² (jct).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Nouvelle nidification à basse altitude sur le site de Chamoson (div. obs.) et dix territoires comptés pour environ 4 km de transect sur les hauts de Fully (beP, eRe SOS VS).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Sur le site de Chamoson, trois territoires dont en tout cas un avec nidification (div. obs.).

MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL

Une escale sur le bas-coteau le 8.4 à Salgesch (Rey) et en plaine le 9.4 à Martigny (beP).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Isolées le 14.3 et le 3.4 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDCHWIRL

Abondamment vue et entendue dès le 18.4 et durant tout le mois de mai, au coude du Rhône et à Leuk-Gampel, secteur où cSi relève un total étonnant de 23 ind en escale le 7.5. Une mention le 20.5 sur Conthey, 1750 m (jct), et une dernière à la traîne le 4.6 à Oberwald (aGe).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFRÖHRSÄNGER

Seulement dans la première décennie de mai, à Leuk et Martigny-Fully (cSi; beP).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Dans la basse plaine, au moins 6 ch le 12.5 à la gouille d'Illarsaz (eRe) et 9 le 22.6 aux Rigoles de Vionnaz (jct).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER

Chante durant la première décennie de mai à Leuk et Grône (cSi; mPe), sans suite, et 2 ch entre le 27.5 et le 3.6 à Collombey et aux Rigoles de Vionnaz, pas réentendus (eS).

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Vue de façon isolée à Leuk-Gampel du 1 au 14.5 (cSi, U. Kägi), puis un ch hors dates le 18.6 à Leuk (jct).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Indices de nidification en plaine: 1 c installé au marais de Grône (Rey), notamment 3 ch le 14.5 à Leuk-Turtmann (beP, eRe), 1 ch le 31.5 à Martigny (beP), 2 ch le 16.6 à Collombey, en des sites inédits (eRe), et 1 ind alarmant le 14.7 au bord du Rhône de Grône (cMo). Sur le coteau à Fully (beP), Ayent (jct) et Gampel (beP).

FAUVETTE PITCHOU, PROVENCEGRASMÜCKE (Page/Seite 64)

Un m ch les 21-22.5 à Fully (eRe, jeF; CAvS), 4^e donnée pour la Suisse.

FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE (Page/Seite 64)

Année faste, particulièrement au coude du Rhône. Migratrices vues les 16.4 (liM), 24.4 (beP) et 10.5 (beP, eRe) à Martigny, et 1 ch le 11.5 à Leuk (liM). Dès le 15.5, des ch sont entendus dans les steppes des Follatères (Fully), où quatre territoires (!) sont identifiés jusqu'au 23.5: 2 sont rapidement abandonnés, un troisième est déserté par un c durant la construction du nid; quant au quatrième, il sera le théâtre de la deuxième nidification de l'espèce en Suisse, avec des nourrissages de 2-3 juv hors du nid notés entre le 19 et le 25.6 (POSSE & REVAZ 2005).

FAUVETTE ÉPERVIÈRE, SPERBERGRASMÜCKE

Un ch signalé en un site inédit du Haut-Valais (hDu).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

En migration, notons au moins 10 ind le 25.4 à Martigny et Fully (beP; eRe), et un ch attardé le 3.6 dans le même secteur, 640 m (beP). Etage subalpin/alpin mis à part, est entendue durant la première quinzaine de juin sur l'adret haut-valaisan entre Rotafen et Gampel, 700-1120 m (div. obs.), ainsi que les 22 et 30.5 à Lalden (gWy).

FAUVETTE GRISLETTE, DORNGRASMÜCKE

Première en avance le 9.4 à Martigny (beP), puis régulière à partir du 25.4. Hors période migratoire: 1 ch le 4.6 dans une friche industrielle d'Evionnaz (eRe), 1 ch le 14.6 à Martigny (D. Marques), 2 ch le 23.6 à Chalais-Sierre (jSa), 1 ch le 15.7 à Vionnaz (nouveau site; mTh) et 5 ch le 11.6 à Leuk (beP, eRe SOS VS), qui profitent des zones de compensation du golf et de l'autoroute. Redressement en cours?

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Exemples de belles densités: 35 ch le 30.5 sur 2 km² au-dessus de Gampel, 1200 m (cSi) et 22 ch le 27.5 sur 1 km² au-dessus de Finges, 750 m (aGe).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Cernant le passage, à noter une vingtaine de migrants le 1.5 à Leuk (cSi). Cantonnements possibles: 3-6 ch les 19-23.5 à Finges (aGe; Sal), 1 ch le 20.5 à Ried-Mörel (aGe), 1 ch le 31.5 sur Gampel, 1300 m (beP), 1-2 ch les 1.5 et 4.6 sur Chamoson (eRe) et 3 ch les 7-10.6 à Nax-St-Martin (beP).

POUILLOT FITIS, FITIS

Mouvements perceptibles dès le 29.3 à Grône (Rey); au moins 30 le 25.4 à Martigny (beP), puis notons 1-2 ch égarés le 9.6 à Leukerbad, 1930 m (K. Rösti), et 1-2 le 30.6 sur Ayent, 1970 m (aSi).

GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER

Un le 7.5 à Leuk (cSi).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

Max printanier de 31 ind le 7.5 à Leuk-Gampel (cSi).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE

Un nid très élevé occupé le 13.7 sous le toit de la cabane du Petit Mountet/Zinal, 2140 m (eBe).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Vu à basse altitude en début de printemps, peut-être chassé des hauteurs par la neige: le 12.3 à Martigny, 500 m (nJ), le 8.4 à Fully, 500 m (beP), le 11.4 à Sion, 640 m (R. & H. Henzelin) et le 16.4 à Brig-Glis, 650 m (C. Katzenmaier).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

8 le 12.4 à Grône (jct) et des cris le 15.5 à Leuk (U. Kägi).

LORIOT, PIROL

Chablais mis à part: 1 c avec m ch le 20.5 à Salvan, 900 m (aSi), et trois données du coteau de Fully en mai-juin-juillet (beP, eRe), probablement des ind migrants ou erratiques; un nouveau cantonnement à Martigny (beP), réinstallation d'un c à Agarn (div. obs.), un ch les 8.5 et 1.7 à Gampel (cSi; beP) et un ch le 20.5 à Visp (T. Wyrer).

PIE-GRÛCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Un à deux territoires à Port-Valais (aBa, eRe), seul nouveau





site de plaine (aval de Sierre) par rapport à l'an dernier. Relevons également une nidification certaine sur Monthey, 600 m (hBe), six territoires le 11.6 en plaine de Leuk-Turtmann (beP, eRe SOS VS) et 8 c le 1.7 à Visperterminen (aGe), plus forte concentration relevée au km².

PIE-GRÛCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Une à Raron le 7.3 (Sal).

CHOCARD, ALPENDOHLE

Des nicheurs de basse altitude sont signalés à Niedergesteln et Raron, 630-750 m (beP, eRe, cSi).

CRAVE, ALPENKRÄHE

Un ind descend le 9.5 sur le coteau de Raron, 700 m (Sal), sans doute en raison des conditions exécrables prévalant en altitude.

CHOUCAS, DOHLE

A part la petite colonie de l'église de St-Maurice, dont l'effectif de 4-5 c est stable (eRe), reproduction attestée à Zeneggen (Zur) et suspectée à Visp (aAe).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Présente aussi dans le Goms: 1 à 5 oiseaux vus les 3.5 et 26-27.7 entre Geschinen et Oberwald (mEg; aGe).

GRAND CORBEAU, KOLKRABE

Grands rassemblements signalés à Leuk-Turtmann: 75 ind le 18.4 (Sal) et 60-65 les 1-5.5 (cSi).

ETOURNEAU, STAR

50 ind de retour le 22.2 à Baltschieder (Ker), puis relevons 700 ind le 6.3 à Chamoson (beP).

MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING

Des indices de reproduction élevés dans le val d'Hérens: le 7.6 à Mase, 1390 m, et le 10.6 à St-Martin, 1480 m (beP).

LINOTTE, HÄNFLING

Encore des regroupements importants à début mai: une centaine les 1 et 9.5 à Martigny (beP) et au moins 180 le 5.5 entre Leuk et Gampel (cSi).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

3 ch en escapade très élevée le 25.5 sur Zermatt, 2830 m (jCt).

ROSELIN, KARMINGIMPEL

Ch signalés en huit points de la haute vallée de Conches (aGe, U. Glutz von Blotzheim, S. Bächli), dont certains se recourent peut-être.

GROSBEC, KERNBEISSER

7 le 5.3 dans une hêtraie dominant Ardon (beP), 2 les 25-27.3 à Bürchen (Zur) et des isolés le 3.4 à Naters, le 20.4 à Niedergesteln (Zur) et le 4.7 à St-Martin, 1500 m (beP). Un ad transportant de la nourriture le 21.5 à Lalden (gWY).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Dans le Valais romand, ch isolés entendus sur Monthey (alB), à Dorénaz (beP), sur Conthey (H. Brügger, jCt), à Sion (pMo), St-Léonard (pMo), Icogne et en deux sites de Lens (aSi). Dans le Haut-Valais, une seule mention hors secteur Salgesch-Raron: 1 le 23.6 à Ried-Mörel (E. Sauser).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Dans le Chablais, 1 le 8.4 aux Rigoles de Vionnaz (nJ) et 1 c le 4.5 sur Monthey (alB). En amont, parmi la grande abondance de données, retenons six territoires le 28.5 pour 1 à 2 km de limite forestière sur les hauts de Fully, 1900-2050 m (beP), et une densité d'au moins douze territoires pour 1 km² le 10.6 à St-Martin, 1000-1550 m (beP).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Une prospection générale menée à l'échelle du canton permet d'attester l'existence de seulement trente-deux territoires: un dans le val d'Entremont, quatre dans le val d'Hérens, vingt et un entre Salgesch et Gampel, quatre à Zermatt, un à Visp et un dans la vallée de Conches (beP, eRe, aSi, aGe SOS VS; S. Bächli, P. Keusch, Zur). Le recul de l'espèce durant la dernière décennie a été drastique (population estimée à 200-250 c en 1993-1996; KEUSCH 1998).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

En période de reproduction, signalé aux Evouettes, à Vionnaz, Martigny, Grône et Turtmann.

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Jamais plus de 2 ch signalés à Leuk-Turtmann (div. obs.)

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

- BAUDAT, J., B. POSSE, R. ARLETTAZ & E. REVAZ 2003. Un Vautour moine *Aegypius monachus* des Grands Causses (Massif Central, France) séjourne six semaines dans les Alpes valaisannes et haut-savoyardes. *Nos Oiseaux* 50: 129-134.
- HIRZEL, A., B. POSSE, P.-A. OGGIER, Y. CRETENAND, CHR. GLENZ & R. ARLETTAZ 2004. Ecological requirements of reintroduced species and the implications for release policy: the case of the bearded vulture. *Journal of Applied Ecology* 41: 1103-1116.
- KEUSCH, P. 1998. Bruant ortolan. In Schmid, H., R. Luder, B. Naef-Daenzer, R. Graf & N. Zbinden: *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique suisse. Sempach. 574 pp.
- POSSE, B. 2003. Chronique ornithologique romande: l'automne 2002 et l'hiver 2002-2003 (première partie). *Nos Oiseaux* 50: 203-216.
- 2003. Chronique ornithologique romande: l'automne 2002 et l'hiver 2002-2003 (deuxième partie). *Nos Oiseaux* 50: 233-244.
- 2004. Chronique ornithologique romande: migrations de printemps et nidifications en 2003. *Nos Oiseaux* 51: 21-44.
- 2004. Chronique ornithologique romande: l'automne 2003 et l'hiver 2003-2004. *Nos Oiseaux* 51: 129-148.
- POSSE, B. & E. REVAZ 2005. Deuxième cas de reproduction de la Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* en Suisse. *Nos Oiseaux* 52: 23-26.
- REVAZ, E & B. POSSE 2004. Le Tarier pâtre *Saxicola torquata* en Valais: évolution de la distribution, des effectifs et de l'habitat. *Bull. Murithienne* 121: 51-65.
- VOISIN, R. & B. POSSE 2005. Le passage automnal du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* à travers les Alpes, à partir de la basse vallée du Rhône (Vaud/Valais). *Nos Oiseaux* 52: 3-16